

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Pappschachtel (20 Injektoren), Container (60 Injektoren) und Container (120 Injektoren)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ubrostar Dry Cow 100 mg / 280 mg / 100 mg Suspension zur intramammären Anwendung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Ein Injektor mit 4,5 g enthält:

Penethamathydroiodid	100 mg (entspricht 77,2 mg Penethamat)
Benethamin Penicillin	280 mg (entspricht 171,6 mg Penicillin)
Framycetinsulfat	100 mg (entspricht 71,0 mg Framycetin)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

20 x 4,5 g (mit 20 Zitzentüchern)  
60 x 4,5 g (mit 60 Zitzentüchern)  
120 x 4,5 g (mit 120 Zitzentüchern)

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder (Kühe beim Trockenstellen).

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG****Intramammären Anwendung.**

Verwenden Sie den Inhalt eines Injektors pro Euterviertel nach dem letzten Melken einer Laktation.

**7. WARTEZEITEN(EN)**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 10 Tage.

Milch: Behandlung mindestens 35 Tage vor dem Kalben: 36 Stunden nach dem Kalben.

Behandlung weniger als 35 Tage vor dem Kalben: 37 Stunden nach der Behandlung.

**8. VERFALLDATUM**

Exp: {MM/JJJJ}

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. ZULASSUNGSNUMMER**

BE-V408003

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****INJEKTOR****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ubrostar Dry Cow

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**Penethamathydroiodid 100 mg, Benethamin-Penicillin 280 mg, Framycetinsulfat  
4,5 g**3. CHARGENBEZEICHUNG**

Lot: {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp {TT/MM/JJJJ}