

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Introflor Vet 300 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Florfenikol.....300 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



Govedo, ovce in prašiči

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Poti uporabe:

Govedo: intramuskularno in subkutano dajanje.

Ovce in prašiči: intramuskularno dajanje.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi:

Govedo: 30 dni (i.m.).

44 dni (s.c.)

Ovce: 39 dni.

Prašiči: 18 dni.

Mleko:

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi, vključno pri brejih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO ”

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI ”

Samo za živali.

12. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Imetnik dovoljenja za promet:
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0831/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Steklena viala, 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Introflor Vet 300 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Florfenikol.....300 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, ovce in prašiči

4. POTI UPORABE

Govedo: intramuskularno in subkutano dajanje.

Ovce in prašiči: intramuskularno dajanje

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

5. KARENCA**Karenca:**

Meso in organi:

Govedo: 30 dni (i.m.).

44 dni (s.c.)

Ovce: 39 dni.

Prašiči: 18 dni.

Mleko:

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi, vključno pri brejih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Načeto zdravilo uporabite do

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Imetnik dovoljenja za promet:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}