

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ
ПРОДУКТ С ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА № 0022-2581/02.07.2015**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Апилайф Вар лента за пчелни кошери

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка лента съдържа:

Активни субстанции:

Thymol	8,00 g
Eucalyptus oil	1,72 g
Camphor, racemic	0,39 g
Levomenthol	0,39 g

Ексципиенти:

За пълен списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Лента за кошер.

Зелена пореста лента, с размери около 7.5 x 5.0 x 0.5 cm, импрегнирана с етерични масла.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Медоносни пчели (*Apis mellifera*).

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Лечение на вароатоза, причинена от *Varroa destructor*.

4.3 Противопоказания

Да не се използва по време на пчелната паша, за да се избегне разваляне вкуса на меда.

Да не се използва когато максималната дневна температура е над 30 °C.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Третирането при температури над 30 °C води до повишаване на стреса и смъртността на възрастните пчели и пчелното пило.

За максимална ефикасност продуктът да се използва към края на лятото, след медосбора, когато количеството пчелно пило прогресивно намалява.

Идеалната външна температура за добра ефикасност на продукта по време на третиране е между 20-25 °C.

Недостатъчна ефикасност може да се очаква, ако средната външна температура е под 15 °C.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да не се надвишава препоръчаната доза. Да не се третират по време на пчелната паша, а след медосбора.

Всички кошери в един и същ пчелин трябва да се третират едновременно с цел избягване на грабеж.

Да се избягва обезпокояването на кошера. Не поставяйте лентата в центъра на кошера или близо до пчелното пило.

Никога не поставяйте лентите близо до хранилката, тъй като това може да намали приема на храна.

Не се препоръчва третиране на кошерите при студено време.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Трябва да се избягва директен контакт с кожата и очите, тъй като тимолът може да предизвика контактен дерматит и дразнене.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от непромокаеми ръкавици и обичайната защитна екипировка трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

След прилагане измийте ръцете си и материалите, които са били в контакт с лентата, със сапун и вода.

При случаен контакт с кожата, измийте обилно със сапун и вода.

При случаен контакт с очите, измийте обилно с чиста течаща вода и потърсете медицинска помощ.

Не вдъшвайте.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Пчелите могат да отстранят храната, намираща се директно под лентата.

Третирането при температури над 30 °C може да доведе до увеличаване на стреса и смъртността на възрастните пчели и пчелното пило.

Колонията може да бъде леко разтревожена по време на третирането.

Може да се намали приема на храна, ако храненето съвпадне с третирането.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Не е приложимо.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Да не се използва едновременно с други акарициди.

4.9 Доза и начин на приложение

Дозиране: 1 лента на всеки 7 дни за всеки кошер, пълно лечение – 4 ленти за всеки кошер. Лечението трябва да се извършва веднъж годишно.

Приложение: за да извършите третирането, вземете една лента от пликчето и я поставете в един от четирите ъгъла над пчелните пити, далеч от пчелното пило, намиращо се в центъра на кошера. Затворете кошера и оставете продукта да действа в продължение на 7 дни.

Лентата може също така да се използва като се нареже на 3-4 парчета, които се поставят в ъглите на кошера (виж Фиг. 1;2;3;4). Повторете лечението в продължение на 4 последователни седмици. След края на лечението всички парчета лента трябва да бъдат отстранени.


Не се препоръчва използването на продукта в многоетажни кошери, тъй като ефикасността може да е незадоволителна.



Фиг.1 Отворете съответната опаковка, съдържаща две ленти.



Фиг.2 Вземете едната от лентите и я разчупете на 3-4 части.



Фиг.3 Отворете кошера и поставете единичните части от лентата в ъглите върху летвата, поддържаща пчелната пита.



Фиг.4 Затворете кошера и оставете продукта да действа в продължение на 7 дни. Повторете третирането 4 пъти с различни ленти и накрая на лечението ги отстранете напълно.

Интегрирано управление на вредителите

Ефикасността може да варира между колонии в зависимост от заобикалящите ги условия (фактори на околната среда, свързани с мястото и климатични условия, температура, генетични особености и ниво на заразяване, повторно заразяване, пчелна популация, издръжливост на дебелото черво, района на пилото и смъртност на пчелите и т.н.). Следователно продуктът трябва да се използва за лечение наред с други продукти, съгласно Интегрираната програма за управление на вредителите, като отпадането на акари трябва да бъде под постоянно наблюдение. Колониите със средно отпадане на повече от 1 акар дневно две седмици след последното третиране, трябва да бъдат подложени на допълнително зимно или пролетно третиране срещу вароатоза (за предпочитане с продукти, съдържащи друга активна субстанция).

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

В случай на предозиране с прекалено много ленти, пчелите могат да бъдат обезпокоени, демонстрирайки повишен стрес и промяна в поведението. Те излизат от кошера и остават навън. Ако се намерят мъртви пчели и ларви, премахнете излишните ленти.

4.11 Карентен срок

Мед: нула дни

Да не се използва по време на пчелната паша, за да се избегнат нежелани вкусови примеси на меда.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ/ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: комбинации от други ектопаразитициди за локална употреба
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QP53AX30.

5.1 Фармакодинамични свойства

Апилайф Вар е съставен от смес от етерични масла (тимол, камфор, ментол и евкалиптол), от които главната субстанция е тимол. Тази смес от етерични масла сублимира, като парите се освобождават вътре в третирания кошер в зависимост от температурата.

Точният им начин на действие не е изяснен. Почти сигурно е, че те действат директно върху акарите чрез вдишване и контакт. Това води до отпадане на акарите от пчелите.

5.2 Фармакокинетични особености

Фармакокинетиката на активните субстанции на Апилайф Вар при пчелите не е известна.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

Пореста фенолна смола.

6.2 Несъвместимости

Не е приложимо.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: всички ленти в отворено саше трябва да се използват незабавно.

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява при температура под 25 °C

Да не се охлажда или замразява.
Да се пази от пряка слънчева светлина.
Да се пази от замръзване.
Да се съхранява в оригиналната опаковка.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Сашета от полиестер/хартия–полиетилен/алуминий/полипропилен ламинат, съдържащи по две ленти, всяка с тегло приблизително 11 g.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. Апилайф Вар не бива да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за риби или други водни организми.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

CHEMICALS LAIF s.p. a.
V.le dell'Artigianato n° 13, 35010
Vigonza (PD), Италия

8. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

0022 – 2581/02.07.2015

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

02.07.2012

10. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

05/2015

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Няма.

Продуктът може да бъде продаван и извън ветеринарномедицински аптеки без лекарско предписание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

