

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****KARTONS****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Suiseng Coli / C Injektionssuspension.

2. WIRKSTOFF(E)

Zusammensetzung pro Dosis (2 ml):

Fimbrien-Adhäsine F4ab von <i>E. coli</i>	≥ 65 % ER ₆₀
Fimbrien-Adhäsine F4ac von <i>E. coli</i>	≥ 78 % ER ₇₀
Fimbrien-Adhäsine F5 von <i>E. coli</i>	≥ 79 % ER ₅₀
Fimbrien-Adhäsine F6 von <i>E. coli</i>	≥ 80 % ER ₂₅
LT-Enterotoxoid von <i>E. coli</i>	≥ 55 % ER ₇₀
Toxoid von <i>Clostridium perfringens</i> Typ C	RP > 1,05
Toxoid von <i>Clostridium novyi</i> Typ B	RP > 1,23

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Dosen (20 ml)
25 Dosen (50 ml)
50 Dosen (100 ml)
125 Dosen (250 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Sauen und Jungsauen).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verwenden.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren. Vor Licht schützen. Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V561893 (Durchstechflasche aus Glas)
BE-V561902 (Durchstechflasche aus PET)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**ETIKETTEN für 50 Dosen und 125 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Suiseng Coli / C Injektionssuspension.

2. WIRKSTOFF(E)

Zusammensetzung pro Dosis (2 ml):

Fimbrien-Adhäsine F4ab von <i>E. coli</i>	≥ 65 % ER ₆₀
Fimbrien-Adhäsine F4ac von <i>E. coli</i>	≥ 78 % ER ₇₀
Fimbrien-Adhäsine F5 von <i>E. coli</i>	≥ 79 % ER ₅₀
Fimbrien-Adhäsine F6 von <i>E. coli</i>	≥ 80 % ER ₂₅
LT-Enterotoxoid von <i>E. coli</i>	≥ 55 % ER ₇₀
Toxoid von <i>Clostridium perfringens</i> Typ C	RP > 1,05
Toxoid von <i>Clostridium novyi</i> Typ B	RP > 1,23

3. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Sauen und Jungsauen).

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Verabreichung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach dem Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verwenden.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren. Vor Licht schützen. Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

10. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 Dosen (100 ml).
125 Dosen (250 ml).

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**ETIKETTEN für 10 Dosen und 25 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Suiseng Coli / C.

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Zusammensetzung pro Dosis (2 ml):

Fimbrien-Adhäsine F4ab, F4ac, F5 und F6 von *E. coli*; LT-Enterotoxoid von *E. coli*, Toxoid von *Clostridium perfringens* Typ C, Toxoid von *Clostridium novyi* Typ B.

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verwenden.

5. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Dosen (20 ml)

25 Dosen (50 ml)