

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**PUDEŁKO TEKTUROWE 100 ml i 250 ml****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Cadorex 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Florfenikol 300 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

250 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owce i świnie

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Bydło: Podanie domięśniowe lub podskórne

Owce: Podanie domięśniowe

Świnie: Podanie domięśniowe

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji

Bydło:

Tkanki jadalne:	Po podaniu domięśniowym:	30 dni
	Po podaniu podskórnym:	44 dni

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u samic ciężarnych produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Owce:

Tkanki jadalne:	Po podaniu domięśniowym:	39 dni
-----------------	--------------------------	--------

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u samic ciężarnych produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Świnie:

Tkanki jadalne: Po podaniu domięśniowym: 18 dni

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Po otwarciu zużyć w ciągu 28 dni

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie zamrażać.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

LIVISTO Int'l, S.L.

Lokalny przedstawiciel oraz dane kontaktowe do zgłaszania podejrzeń zdarzeń niepożądanych:
LIVISTO Sp. z o.o.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 2776/18

15. NUMER SERII

Lot

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**FIOLKA 100 ml i 250 ml****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Cadorex 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Florfenikol 300 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owce i świnie

4. DROGI PODANIA

Bydło: Podanie domięśniowe lub podskórne

Owce: Podanie domięśniowe

Świnie: Podanie domięśniowe

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji

Bydło:

Tkanki jadalne: Po podaniu domięśniowym: 30 dni

Po podaniu podskórnym: 44 dni

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u samic ciężarnych produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Owce:

Tkanki jadalne: Po podaniu domięśniowym: 39 dni

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u samic ciężarnych produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Świnie:

Tkanki jadalne: Po podaniu domięśniowym: 18 dni

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.
Po otwarciu zużyć w ciągu 28 dni.
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do ...

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Nie zamrażać.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

LIVISTO Int'l, S.L.

9. NUMER SERII

Lot