

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel für 50, 100 & 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cevaxel-RTU 50 mg/ml, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Ceftiofur (als Hydrochlorid): 50 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind und Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rinder: subkutane Anwendung

Schweine: intramuskuläre Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe.....8 Tage

Milch..... 0 Stunden

Schweine:

Essbare Gewebe.....5 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen, verwendbar, bis: __/__/__

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE: BE-V387134

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett für 100 & 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cevaxel-RTU 50 mg/ml, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Ceftiofur (als Hydrochlorid): 50 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rind und Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rinder: subkutane Anwendung.

Schweine: intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe:

Schwein: 5 Tage

Rind: 8 Tage

Milch: Null Stunden

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, verwendbar, bis __/__/__

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**9. CHARGENBEZEICHNUNG**


Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett: 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Cevaxel-RTU



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Ceftiofur (als Hydrochlorid): 50 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

4. VERFALLDATUM

Exp.

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, verwendbar, bis ___/___/___