

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/94/0280

**Be-Complex šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem,
kaķiem, ūdelēm un lapsām**

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

bela-pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Be-Comlex šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem, ūdelēm un lapsām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1ml satur:

Aktīvās vielas:

Tiamīna hlorīda hidrohlorīds (B1 vitamīns)	10, 00 mg
Riboflavīna nātrija fosfāts (B2 vitamīns)	5, 47 mg
Piridoksīna hidrohlorīds (B6 vitamīns)	4, 00 mg
Nikotīnamīds	50, 00 mg
D-kalcija pantotenāts	5, 00 mg

Palīgviela:

Benzilspirts	15, 0 mg
--------------	----------

4. INDIKĀCIJA(-S)

Komplekso B vitamīnu (B₁, B₂, B₆, nikotīnamīds, pantotēnskābe) deficīta ārstēšanai un pastiprinātas vitamīnu nepieciešamības gadījumā zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem, ūdelēm un lapsām.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc atkārtotas B1 vitamīna lietošanas atsevišķos gadījumos var novērot pastiprinātas jutības reakcijas.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, cūkas, suņi, kaķi, ūdeles un lapsas.

8. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai:

Zirgiem un liellopiem:	30 ml/dzīvniekam;
Kumeļiem, teļiem, cūkām:	20 ml/dzīvniekam;
Sivēniem, zīdējsivēniem:	2 ml/dzīvniekam;
Suņiem:	3 ml/dzīvniekam;
Kaķiem, ūdelēm, lapsām:	1 ml/dzīvniekam.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lietot vienreizējas injekcijas veidā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 -8 °C). Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Grūsnība un laktācija:

Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Lietot pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Lai izvairītos no nevēlamas zāļu mijiedarbības, nelietot kopā ar citām zālēm.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

01/2018

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.