

A. **BIJSLUITER**

BIJSLUITER**1. Naam van het diergeneesmiddel**

Prinocate 40 mg/10 mg spot-on oplossing voor kleine honden
 Prinocate 100 mg/25 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden
 Prinocate 250 mg/62.5 mg spot-on oplossing voor grote honden
 Prinocate 400 mg/100 mg spot-on oplossing voor zeer grote honden

2. Samenstelling**Actieve bestanddelen, hulpstoffen:**

	Volume [ml]	Imidacloprid [mg]	Moxidectine [mg]	Butylhydroxy tolueen (E 321) [mg]	Benzyl alcohol (E 1519) [mg]
Prinocate 40 mg/10 mg spot-on oplossing voor kleine honden	0,4	40	10	0,4	323
Prinocate 100 mg/25 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden	1	100	25	1	807
Prinocate 250 mg/62.5 mg spot-on oplossing voor grote honden	2,5	250	62,5	2,5	2018
Prinocate 400 mg/100 mg spot-on oplossing voor zeer grote honden	4	400	100	4	3229

Heldere, lichtgele tot gele of bruinig gele oplossing.

3. Doeldiersoorten

Honden.

**4. Indicaties voor gebruik**

Voor honden die lijden aan, of risico lopen op, gemengde parasitaire infecties:

De behandeling en preventie van vlooiëneninfestatie (*Ctenocephalides felis*),



De behandeling van bijtende luizen (*Trichodectes canis*),



De behandeling van oormijtinfestatie (*Otodectes cynotis*), schurft (veroorzaakt door *Sarcoptes scabiei*

var. *canis*), demodicose (veroorzaakt door *Demodex canis*),



Preventie van hartworm (L3 en L4 larven van *Dirofilaria immitis*),



De behandeling van circulerende microfilariae (*Dirofilaria immitis*),



De behandeling van cutane dirofilariose (volwassen stadia van *Dirofilaria repens*),



De preventie van cutane dirofilariose (L3 larven van *Dirofilaria repens*),



De vermindering van circulerende microfilariae (*Dirofilaria repens*),



De preventie van angiostrongylose (L4 larven en onvolgroeide stadia van *Angiostrongylus vasorum*),



De behandeling van *Angiostrongylus vasorum* en *Crenosoma vulpis*,



De preventie van spirocerose (*Spirocerca lupi*),



De behandeling van *Eucoleus* (syn. *Capillaria*) *boehmi* (volwassen stadia),



De behandeling van de oogworm *Thelazia callipaeda* (volwassen stadia),



De behandeling van infecties met gastro-intestinale nematoden (L4 larven, onvolgroeide en volwassen stadia van *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum* en *Uncinaria stenocephala*, volwassen

stadia van *Toxascaris leonina* en *Trichuris vulpis*).



Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).

5. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij pups jonger dan 7 weken.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

Niet gebruiken bij honden geclassificeerd als klasse 4 voor hartworm, daar de veiligheid van het diergeneesmiddel niet is onderzocht in deze diergroep.

Voor katten moet het corresponderende diergeneesmiddel (0,4 of 0,8 ml) gebruikt worden, dat 100 mg/ml imidacloprid en 10 mg/ml moxidectine bevat.

Voor fretten: Het diergeneesmiddel voor honden niet gebruiken. Enkel het diergeneesmiddel voor kleine katten en fretten (0,4 ml) mag gebruikt worden.

Niet gebruiken bij kanaries.

6. Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen:

Zie subsectie “Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoorten”.

Kortstondig contact van het dier met water bij één of twee gelegenheden tussen de maandelijkse behandelingen zal waarschijnlijk de werkzaamheid van het diergeneesmiddel niet verminderen.

Echter, frequent shampooën of het dier onderdompelen in water na de behandeling kan de werkzaamheid van het diergeneesmiddel verminderen.

Parasitaire resistentie ten opzichte van elke klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent, herhaald gebruik van een anthelminticum van die klasse. Daarom moet het gebruik van dit diergeneesmiddel worden gebaseerd op de beoordeling van elk individueel geval en op lokale epidemiologische informatie over de huidige gevoeligheid van de doelsoorten teneinde de mogelijkheid van een toekomstige selectie voor resistentie te voorkomen.

Het gebruik van het diergeneesmiddel moet worden gebaseerd op de bevestigde diagnose van gemengde infecties (of risico van infectie, waar preventie van toepassing is) op hetzelfde moment (zie ook rubrieken " Toedieningswegen en dosering "en "Indicaties voor gebruik voor elke doeldiersoort"). Werkzaamheid tegen volwassen *Dirofilaria repens* is niet in de praktijk getest.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoorten:

Behandeling van dieren van minder dan 1 kg dient gebaseerd te zijn op een risico-baten beoordeling. Er is beperkte ervaring met het gebruik van het diergeneesmiddel bij zieke of verzwakte dieren. Daarom dient het diergeneesmiddel bij deze dieren enkel gebruikt te worden na een baten/risicobeoordeling.

Er moet voor gezorgd worden dat de inhoud van de pipet of de toegediende dosis niet in contact komt met de ogen of de bek van het behandelde dier en/of andere dieren. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar likken. Wanneer het diergeneesmiddel op 3 tot 4 afzonderlijke plaatsen wordt aangebracht (zie rubriek 3.9), moet speciale aandacht worden besteed aan het voorkomen dat het dier de toedieningsplaatsen likt.

Het diergeneesmiddel alleen aanbrengen op onbeschadigde huid.

Dit diergeneesmiddel bevat moxidectine (een macrocyclisch lacton). Daarom moet bij Collies of Old English Sheepdogs en gerelateerde of gekruiste rassen speciale aandacht worden geschonken aan de juiste toediening van het diergeneesmiddel zoals beschreven onder rubriek " Toedieningswegen en dosering "; in het bijzonder moet orale opname door het behandelde dier en/of andere dieren in de nabije omgeving worden voorkomen.

De veiligheid van het diergeneesmiddel werd enkel geëvalueerd bij honden geclassificeerd als klasse 1 en 2 voor hartworm tijdens laboratoriumstudies en bij een aantal honden geclassificeerd als klasse 3 in een veldstudie. Daarom moet het gebruik bij honden met duidelijke of ernstige symptomen van de ziekte gebaseerd worden op een zorgvuldige baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Alhoewel experimentele overdoseringsstudies hebben aangetoond dat het diergeneesmiddel veilig kan worden toegediend aan honden die besmet zijn met volwassen hartworm, heeft het geen therapeutisch effect tegen volwassen *Dirofilaria immitis*.

Het wordt daarom aanbevolen dat alle honden ouder dan 6 maanden en verblijvend in regio's waar hartworm endemisch is, worden getest voor bestaande volwassen hartworminfecties alvorens de behandeling met het diergeneesmiddel te starten. Naar inzicht van de dierenarts dienen geïnfecteerde honden behandeld te worden met een adulticide om volwassen hartworm te verwijderen. De veiligheid van de combinatie van imidacloprid en moxidectine is niet geëvalueerd bij toediening op dezelfde dag als een adulticide.

Imidacloprid is giftig voor vogels, in het bijzonder kanaries.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Om kinderen de toegang tot met de pipetten te beletten, bewaar de pipetten in de oorspronkelijke verpakking tot gebruik en verwijder gebruikte pipetten onmiddellijk.

Niet innemen. In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor benzylalcohol, imidacloprid of moxidectine dienen bij toediening van het diergeneesmiddel grote voorzichtigheid in acht te nemen.

In zeer zeldzame gevallen kan het diergeneesmiddel huidovergevoeligheid of huidreacties van voorbijgaande aard (bv. gevoelloosheid, irritatie of branderig/tintelend gevoel) veroorzaken.

In zeer zeldzame gevallen kan het diergeneesmiddel irritatie van de luchtwegen veroorzaken bij gevoelige personen.

Indien het diergeneesmiddel per ongeluk in de ogen terechtkomt, moeten de ogen grondig worden gespoeld met water.

Vermijd contact met de huid, ogen of mond.

In geval van accidenteel morsen op de huid, onmiddellijk afwassen met zeep en water.

Was de handen grondig na gebruik.

Indien huid- of oogsymptomen aanhouden, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Niet eten, drinken of roken tijdens de toepassing.

Behandelde dieren mogen niet worden aangeraakt, vooral niet door kinderen, totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt aanbevolen het diergeneesmiddel 's avonds aan te brengen. Recent behandelde dieren mogen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaar, vooral niet bij kinderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu:

Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen: moxidectine is uiterst giftig voor waterorganismen.

Honden mogen 4 dagen na de behandeling niet in oppervlaktewater zwemmen.

Overige voorzorgsmaatregelen:

Het oplosmiddel in het diergeneesmiddel kan bepaalde materialen zoals leer, stoffen, plastics en gelakte oppervlakken beschadigen of bevleken. Laat de toedieningsplaats drogen alvorens contact met dergelijke materialen toe te laten.

Dracht en lactatie:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht of lactatie. Uit laboratoriumonderzoek bij ratten en konijnen met imidacloprid of moxidectine zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Gedurende de behandeling met het diergeneesmiddel mogen geen andere antiparasitaire macrocyclische lactonen toegediend worden.

Er werden geen interacties waargenomen tussen de combinatie imidacloprid/moxidectine en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen dan wel medische of chirurgische procedures.

Overdosering:

Tot 10 maal de aanbevolen dosering van de combinatie imidacloprid en moxidectine werd getolereerd bij volwassen honden zonder het optreden van bijwerkingen of ongewenste klinische symptomen.

Vijf maal de aanbevolen minimale dosering, toegediend met wekelijks interval gedurende 17 weken, werd onderzocht en getolereerd bij honden ouder dan 6 maanden zonder het optreden van bijwerkingen of ongewenste klinische symptomen.

Eén tot vijf maal de aanbevolen dosering van de combinatie van imidacloprid en moxidectine werd toegediend bij pups, om de twee weken voor zes behandelingen, zonder ernstige veiligheidsrisico's. Voorbijgaande mydriasis, speekselvloeï, braken en voorbijgaande versnelde ademhaling werden waargenomen.

Na accidentele orale opname of overdosering kunnen zich in zeer zeldzame gevallen neurologische symptomen (waarvan de meeste van voorbijgaande aard zijn), zoals ataxie, veralgemeende tremoren, oculaire symptomen (verwijde pupillen, verminderde pupil reflex, nystagmus), abnormale ademhaling, speekselvloeï en braken voordoen.

Ivermectine gevoelige collies tolereerden tot 5 maal de aanbevolen dosering, herhaald met intervallen van 1 maand, zonder enig schadelijk effect, maar de veiligheid van toediening met intervallen van 1 week werd niet onderzocht bij ivermectine gevoelige collies. Wanneer 40% van de dosis oraal werd gegeven, werden ernstige neurologische symptomen waargenomen, terwijl de orale toediening van 10% van de dosis geen schadelijke effecten veroorzaakte.

Honden geïnfecteerd met volwassen hartwormen, tolereerden zonder enig schadelijk effect tot 5 maal de aanbevolen dosering, 3 behandelingen om de 2 weken toegediend. In geval van accidentele orale opname dient een symptomatische behandeling te worden ingesteld. Er is geen specifiek antidotum bekend. Het gebruik van actieve kool kan zinvol zijn.

7. Bijwerkingen

Honden:

Vaak (1 tot 10 dieren/100 behandelde dieren):
Diarree ¹ , Braken ¹ Hoesten ¹ , Dyspnou (abnormale ademhaling) ¹ , Tachypneu (hyperventilatie) ¹ Gebrek aan eetlust ¹ , Lethargie ¹
Zelden (1 tot 10 dieren/10.000 behandelde dieren):
Braken ² Toedieningsplaats vette vacht ² , Toedieningsplaats erytheem (roodheid) ² , Lokale overgevoelheidsreactie ³
Zeer zelden (<1 dier/10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde meldingen):
Gedragsveranderingen (zoals b.v agitatie) ⁴ Inappetence ⁴ , Lethargy ⁴ Neurologische symptomen ⁵
Onbepaalde frequentie (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):
Jeuk ⁶ Speekselvloeï ⁷

¹ Deze verschijnselen komen vaak bij honden die positief zijn voor hartworm met microfilaremie. Bij ernstige ademhalingsymptomen (hoesten, tachypneu en dyspneu) die snelle veterinaire behandeling kan vereisen.

² Deze symptomen verdwijnen zonder verdere behandeling.

³ Lokaal.

⁴ Voorbijgaand opgemerkt en gerelateerd aan gevoel op de toedieningsplaats.

⁵ Wanneer het dier na de behandeling de plaats van toediening likt, kunnen in zeer zeldzame gevallen neurologische symptomen (waarvan de meeste van voorbijgaande aard) waargenomen worden (zie rubriek 3.10).

⁶ Voorbijgaande.

⁷ Het kan voorkomen wanneer het dier de plaats van toediening onmiddellijk na behandeling likt. Dit is geen symptoom van intoxicatie en verdwijnt binnen enkele minuten zonder behandeling. Correcte toediening zal de mogelijkheid de toedieningsplaats te likken, beperken.

Het melden van bijwerkingen is belangrijk. Op deze manier kan de veiligheid van een diergeneesmiddel voortdurend worden bewaakt. Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiters worden vermeld, of u vermoedt dat het geneesmiddel niet heeft gewerkt, neem dan in eerste instantie contact op met uw dierenarts. U kunt bijwerkingen ook melden aan de houder van de vergunning voor het in de handel brengen of diens lokale vertegenwoordiger met behulp van de contactgegevens aan het einde van deze bijsluiters of via uw nationale meldsysteem: adversedrugreactions_vet@fagg-afmps.be.

8. Dosering voor elke diersoort, toedieningswijzen en toedieningswegen

Spot-on gebruik. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Topicaal toedienen op de huid tussen de schouderbladen.

Doseringsschema:


De aanbevolen minimumdosering diergeneesmiddel bedraagt 10 mg/kg lichaamsgewicht imidacloprid en 2,5 mg/kg lichaamsgewicht moxidectine, overeenkomend met 0,1 ml/kg lichaamsgewicht.

Het behandelingsschema dient gebaseerd te worden op individuele veterinaire diagnose en de lokale epidemiologische situatie.

Toediening volgens de volgende tabel:

Honden [kg]	Te gebruiken pipet	Volume [ml]	Imidacloprid [mg/kg LG]	Moxidectine [mg/kg LG]
≤ 4	imidacloprid/moxidectine 40 mg/10 mg spot-on oplossing voor kleine honden	0,4	minimaal 10	minimaal 2,5
> 4 - 10	imidacloprid/moxidectine 100 mg/25 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden	1	10 - 25	2,5 - 6,25
> 10 - 25	imidacloprid/moxidectine 250 mg/62,5 mg spot-on oplossing voor grote honden	2,5	10 - 25	2,5 - 6,25
> 25 - 40	imidacloprid/moxidectine 400 mg/100 mg spot-on oplossing voor zeer grote honden	4	10 - 16	2,5 - 4
> 40	de juiste combinatie van pipetten om de aanbevolen dosering te leveren (de minimale aanbevolen dosering is 0,1 ml diergeneesmiddel/kg lichaamsgewicht)			

Vlooienbestrijding en -preventie (*Ctenocephalides felis*)



Eén behandeling voorkomt verdere vlooieninfestatie tot 4 weken. Aanwezige poppen in de omgeving kunnen nog uitkomen tot 6 weken of langer nadat de behandeling werd gestart, afhankelijk van de klimaatcondities. Daarom kan het noodzakelijk zijn de behandeling met dit diergeneesmiddel te combineren met een omgevingsbehandeling teneinde de levenscyclus van de vlo in de omgeving te onderbreken. Dit kan resulteren in een snellere afname van de vlooienpopulatie in huis. Het diergeneesmiddel dient maandelijks te worden toegediend wanneer het gebruikt wordt als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis.

Behandeling van bijtende luizen (*Trichodectes canis*)



Het diergeneesmiddel dient eenmalig toegediend te worden. Controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling wordt aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn.

Behandeling van oormijtinfestatie (*Otodectes cynotis*)



Het diergeneesmiddel dient eenmalig toegediend te worden. Los debris moet bij elke behandeling voorzichtig uit de externe gehoorgang worden verwijderd. Controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling wordt aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn. Niet direct in het oorkanaal toedienen.

Behandeling van schurft (veroorzaakt door *Sarcoptes scabiei* var. *canis*)



Het diergeneesmiddel dient tweemaal toegediend te worden met een tussenperiode van 4 weken.

Behandeling van demodicose (veroorzaakt door *Demodex canis*)



De toediening van een enkele dosis om de 4 weken gedurende 2 tot 4 maanden is effectief tegen *Demodex canis* en leidt tot een aanzienlijke verbetering van de klinische symptomen, vooral bij milde tot matige gevallen. In geval van vooral ernstige gevallen kan een meer langdurige en frequentere behandeling nodig zijn. Om de best mogelijke reactie in deze ernstige gevallen te bereiken, kan het medicijn, naar het oordeel van de dierenarts, eenmaal per week en gedurende een langere tijd worden toegediend. In alle gevallen is het essentieel dat de behandeling wordt voortgezet totdat huidafkrabsels gedurende ten minste twee opeenvolgende maanden negatief zijn. Behandeling moet worden gestopt bij honden die geen verbetering vertonen of geen reactie tonen in het aantal mijten na twee maanden behandeling. Alternatieve behandelingen dienen te worden toegepast. Raadpleeg de dierenarts. Aangezien demodicose een multifactoriële aandoening is, is het raadzaam om, indien mogelijk, ook onderliggende aandoeningen op de juiste wijze te behandelen.

Preventie van hartworm (*D. immitis*)



en cutane dirofilariose (huidworm) (*D. repens*)



Honden die verblijven in of reizen naar regio's endemisch besmet met hartworm, kunnen geïnfecteerd zijn met volwassen hartworm. Om deze reden dient vóór een behandeling met het diergeneesmiddel het advies in rubriek 'Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik' te worden overwogen.

Voor de preventie van hartworm en cutane dirofilariose dient het diergeneesmiddel iedere maand toegepast te worden gedurende de tijd van het jaar wanneer muggen (de intermediaire gastheer die de *D. immitis* en de *D. repens* larven draagt en overbrengt) aanwezig zijn. Het diergeneesmiddel kan het gehele jaar door worden toegediend of tenminste één maand voor de eerste verwachte blootstelling aan muggen. De behandeling dient met regelmatige intervallen van 1 maand te worden voortgezet tot één maand na de laatste blootstelling aan muggen. Om een routinebehandeling te krijgen, is het aanbevolen dat op dezelfde dag of datum van elke maand wordt behandeld. Indien een ander preventief diergeneesmiddel in een hartworm preventieprogramma wordt vervangen, dient de eerste behandeling met dit diergeneesmiddel uitgevoerd te worden binnen de maand na de laatste toegediende dosis van de vorige medicatie. In niet-endemische regio's is er geen risico voor hartwormbesmetting bij de hond. Daarom kunnen ze behandeld worden zonder speciale voorzorgen.

Behandeling van microfilariae (*D. immitis*)



Het diergeneesmiddel dient maandelijks te worden toegediend gedurende twee opeenvolgende maanden.

Behandeling van cutane dirofilariose (huidworm) (volwassen stadia van *Dirofilaria repens*)



Het diergeneesmiddel dient maandelijks te worden toegediend gedurende 6 opeenvolgende maanden.

Vermindering van microfilariae (huidworm) (*D. repens*)



Het diergeneesmiddel dient maandelijks te worden toegediend gedurende vier opeenvolgende maanden.

Behandeling en preventie van *Angiostrongylus vasorum*



Het diergeneesmiddel dient eenmalig toegediend te worden. Controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling wordt aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn. In endemische regio's zal regelmatige maandelijkse toediening *Angiostrongylus vasorum* infectie (angiostrongylose) voorkomen.

Behandeling van *Crenosoma vulpis*



Het diergeneesmiddel dient eenmalig toegediend te worden.

Preventie van spirocercose (*Spirocerca lupi*)



Het diergeneesmiddel dient maandelijks te worden toegediend.

Behandeling van *Eucoleus* (syn. *Capillaria*) *boehmi* (volwassen stadia)

Het diergeneesmiddel dient maandelijks te worden toegediend gedurende twee opeenvolgende maanden. Het is raadzaam om tussen de twee behandelingen autocoprofagie te verhinderen ter preventie van mogelijke herinfectie.

Behandeling van de oogworm *Thelazia callipaeda* (volwassen stadia)

Een enkele dosis van het diergeneesmiddel dient te worden toegediend.

Behandeling van rondwormen, haakwormen en zweepwormen (*Toxocara canis*, *Ancylostoma*


caninum, *Uncinaria stenocephala*, *Toxascaris leonina* en *Trichuris vulpis*) 

In regio's endemisch voor hartworm kan maandelijks behandeling het risico op herinfectie door respectievelijk rond-, haak- en zweepwormen significant reduceren. In regio's die niet-endemisch voor hartworm zijn, kan het diergeneesmiddel worden gebruikt als onderdeel van een seizoensgebonden preventieprogramma tegen vlooien en gastro-intestinale nematoden.

Studies hebben aangetoond dat maandelijks behandeling van honden infecties met *Uncinaria stenocephala* voorkomen.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

1. Neem één pipet uit de verpakking. Houd de tube rechtop, draai en verwijder het dopje.
2. Draai het dopje om en plaats het omgekeerd weer op de pipet. Duw en draai het dopje erop, om de zegel te verbreken. Verwijder het dopje van de pipet.



Voor honden tot 25 kg:

3. Terwijl de hond stilstaat, scheidt u de vacht tussen de schouderbladen totdat de huid zichtbaar is. Het diergeneesmiddel mag alleen op onbeschadigde huid worden aangebracht. Plaats de punt van de pipet op de huid en knijp enkele keren stevig om de inhoud rechtstreeks op de huid te legen.



Voor honden van meer dan 25 kg:

3. Voor eenvoudige toepassing moet de hond staan. De gehele inhoud van de pipet moet gelijkmatig worden aangebracht als 3 of 4 vlekken langs de bovenkant van de rug, van tussen de schouders tot de basis van de staart. Scheid op elke plek de vacht tot de huid zichtbaar is. Het diergeneesmiddel mag

alleen op onbeschadigde huid worden aangebracht. Plaats de punt van de pipet op de huid en knijp zachtjes in de pipet om een deel van de oplossing op de huid te lozen. Breng op geen enkele plek een te grote hoeveelheid oplossing aan, omdat hierdoor een deel van het diergeneesmiddel langs de zijkant van het dier kan lopen.



10. Wachttijden

Niet van toepassing.

11. Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaartemperatuur.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het na Exp. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

12. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen, aangezien imidacloprid en moxidectin gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

Maak gebruik van terugnameregelingen voor de verwijdering van ongebruikte diergeneesmiddelen of uit het gebruik van dergelijke middelen voortvloeiend afvalmateriaal in overeenstemming met de lokale voorschriften en nationale inzamelingssystemen die van toepassing zijn. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen.

13. Indeling van het diergeneesmiddel

Diergeneesmiddel op voorschrift

14. Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen en verpakkingsgrootten

Prinocate 40 mg/10 mg spot-on oplossing voor kleine honden:
BE-V554000 (Pipet met HDPE punt)
BE-V554017 (Pipet met POM punt)

BE-V554026 (Pipet met PP punt)

Prinocate 100 mg/25 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden:

BE-V554035 (Pipet met HDPE punt)

BE-V554044 (Pipet met POM punt)

BE-V554053 (Pipet met PP punt)

Prinocate 250 mg/62,5 mg spot-on oplossing voor grote honden:

BE-V554062 (Pipet met HDPE punt)

BE-V554071 (Pipet met POM punt)

BE-V554080 (Pipet met PP punt)

Prinocate 400 mg/100 mg spot-on oplossing voor zeer grote honden:

BE-V554097 (Pipet met HDPE punt)

BE-V554106 (Pipet met POM punt)

BE-V554115 (Pipet met PP punt)

Verpakkingsgrootten:

Kartonnen doos met 1, 3, 4, 6, 24 of 48 pipetten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

15. Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

Maart 2025

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar in de diergeneesmiddelenbank van de Unie (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Contactgegevens

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte en contactgegevens voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

Tel: +32 487 50 73 62

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.