

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

#### 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CALCIO PH, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, άλογα, χοίρους, πρόβατα, αίγες, κουνέλια, σκύλους, γάτες

#### 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

##### Σύνθεση

##### Ποσότητα

Κάθε ml περιέχει:

##### Δραστικά συστατικά:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Calcium gluconate              | 200 mg  |
| Phosphorylcolamine             | 2,54 mg |
| Magnesium chloride hexahydrate | 3,34 mg |

##### Έκδοχα:

Sorbitol  
Sodium methyl parahydroxybenzoate  
Sodium propyl parahydroxybenzoate

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλέπε στο μέρος 6.1.

#### 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο διάλυμα

#### 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

##### 4.1 Είδη ζώων

Βοοειδή, άλογα, χοίροι, αίγες, πρόβατα, κουνέλια σκύλοι και γάτες.

##### 4.2 Ενδείξεις για τη χρήση προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Επιλόχεια πάρεση, παραπληγία πριν και μετά τον τοκετό, πυρετός μεταφοράς, αλλεργίες, ως γενικό τονοτικό.

##### 4.3 Αντενδείξεις

Η χορήγηση ασβεστίου αντενδεικνύεται κατά την διάρκεια θεραπείας με δακτυλίτιδα.

##### 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Καμία

##### 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

##### Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Καμία

**Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα**

Καμία

**4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες(συχνότητα και σοβαρότητα)**

Καμία γνωστή

**4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία και την ωοτοκία**

Το Calcio PH ενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, κατά προτίμηση μετά την εκτίμηση του οφέλους/ κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

**4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης.**

Καμία γνωστή

**4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης**

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Βοοειδή, άλογα                                   | 250 ml/ ζώο   |
| Μόσχοι, πουλάρια, χοίροι, αίγες, πρόβατα         | 50-150ml/ζώο  |
| Χοιρίδια, αμνοί, ερίφια, κουνέλια, σκύλοι, γάτες | 15-50 ml/ ζώο |

Χορηγείτε αργά με υποδόρια, ενδοφλέβια, ενδοπεριτοναική ή ενδομυϊκή έγχυση. Επαναλαμβάνετε σύμφωνα με τη συμβουλή του κτηνιάτρου.

**4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα),εάν\_είναι απαραίτητο**

Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις

**4.11 Χρόνος(οι) αναμονής**

Κρέας : 0 μέρες

Γάλα: 0 ώρες

**5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

**Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: συμπληρώματα μετάλλων**

**ATC Vet Code: QA12AX**

**5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες**

Το CALCIO PH περιέχει συστατικά, για την αποκατάσταση της ισορροπίας του ασβεστίου-μαγνησίου-φωσφόρου. Η διαταραχή στην ισορροπία των ιόντων αυτών είναι η συχνότερη αιτία για την επιλόχεια πάρεση.

Το ασβέστιο που περιέχει το CALCIO PH προέρχεται από το σύμπλεγμα του calcium borogluconate που προέρχεται από την αντίδραση μεταξύ του γλυκονικού ασβεστίου και του βορικού οξέος, ενώ ο φώσφορος προέρχεται από το phosphorylcolamine και το μαγνήσιο από το χλωριούχο άλας του.

Εκτός από την απευθείας δράση του στην ισορροπία των ιόντων του αίματος ο φώσφορος προσφέρει τόνωση και ενέργεια μαζί με την sorbitόλη η οποία αποτοξινώνει επίσης το ήπαρ.

Ως επακόλουθο υπάρχει μια σειρά από θεραπευτικά αποτελέσματα που είναι ευεργετικά κατά την περίοδο πριν και μετά τον τοκετό και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην δημιουργία ενός γενικού τονοτικού αποτελέσματος.

## 5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία

Στο αίμα, τα άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου και η phosphorylcolamine απελευθερώνουν τους αντίστοιχους ηλεκτρολύτες οι οποίοι εμπλέκονται σε πολλές μεταβολικές διεργασίες. Ο φώσφορος και το μαγνήσιο απεκκρίνονται κυρίως με τα ούρα ενώ το ασβέστιο απομακρύνεται μέσω των κοπράνων.

## 6 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

### 6.1 Κατάλογος εκδόχων

#### Έκδοχα:

Crystallizable sorbitol

Boric acid

Sodium chloride

Sodium methyl parahydroxybenzoate

Sodium propyl parahydroxybenzoate

Water for injections

### 6.2 Ασυμβατότητες

Το Calcium gluconate ενέσιμο διάλυμα είναι ασύμβατο με: metoclopramide HCl, methylprednisolone sodium succinate, amphotericin B, cefamandole naphthate, cephalothin sodium, dobutamine HCl.

Να μην χορηγείται ταυτόχρονα με φάρμακα που περιέχουν ενώσεις με διττανθρακικό, θειικές ενώσεις και φωσφορικές ενώσεις.

### 6.3 Διάρκεια ζωής

5 χρόνια όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις συνθήκες φύλαξης στην αρχική του συσκευασία.

Η μεγαλύτερη περίοδος χρήσης μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη είναι 28 μέρες.

### 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως και πηγές θερμότητας.

### 6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

250 και 500 ml τύπου I και/ή τύπου II γυάλινη φιάλη, που κλείνει με ελαστικό καπάκι και σφραγίζεται με κολλάρο από αλουμίνιο.

### 6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον.

Το χρησιμοποιημένο προϊόν ή το άχρηστο υλικό πρέπει να καταστρέφεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας. Το μη χρησιμοποιημένο υλικό πρέπει να μεταφέρεται στο μέρος τοποθέτησης των ληγμένων ή μη χρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών προϊόντων.

## 7.ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

FATRO S.p.A. Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna) Italy

**8.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

12313

**9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ**

7/10/1994

**10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ**

18/5/2011

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

#### A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

##### 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

CALCIO PH ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, άλογα, χοίρους, πρόβατα, αίγες, κουνέλια, σκύλους, γάτες

##### 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

###### Σύνθεση

###### Ποσότητα

Κάθε ml περιέχει:

###### Δραστικά συστατικά:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Calcium gluconate              | 200 mg  |
| Phosphoryl colamine            | 2,54 mg |
| Magnesium chloride hexahydrate | 3,34 mg |

###### Έκδοχα:

Sorbitol  
Sodium methyl parahydroxybenzoate  
Sodium propyl parahydroxybenzoate

##### 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο διάλυμα

##### 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250 ml

##### 5. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ(ΤΑ) ΟΠΟΙΟ(Α) ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Βοοειδή, άλογα, χοίροι, αίγες, πρόβατα, κουνέλια σκύλοι και γάτες.

##### 6. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Επιλόχεια πάρεση, παραπληγία πριν και μετά τον τοκετό, πυρετός μεταφοράς, αλλεργίες, ως γενικό τονωτικό.

##### 7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Βοοειδή, άλογα:                                  | 250ml/ζώο    |
| Μόσχοι, πουλάρια, χοίροι, αίγες, πρόβατα:        | 50-150ml/ζώο |
| Χοιρίδια, αμνοί, ερίφια, κουνέλια σκύλοι, γάτες: | 15-50 ml/ζώο |

- Χορηγείται με αργή υποδόρια, ενδοφλέβια, ενδοπεριτοναϊκή ή ενδομυϊκή έγχυση. Επαναλαμβάνετε σύμφωνα με τη συμβουλή του κτηνιάτρου.

**8. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Κρέας: μηδέν μέρες  
Γάλα: μηδέν μέρες

**9. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ**

Καμία.

**10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ**

ΛΗΞΗ (μήνας/έτος)

**11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Φυλάσσεται μακριά από το φως και πηγές θερμότητας.

Διάρκεια ζωής: 5 χρόνια όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις συνθήκες φύλαξης στην αρχική του συσκευασία.

Η μεγαλύτερη περίοδος χρήσης μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη είναι 28 μέρες.

**12. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν**

Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον. Το αχρησιμοποίητο προϊόν ή το άχρηστο υλικό πρέπει να καταστρέφεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας. Το μη χρησιμοποιημένο υλικό πρέπει να μεταφέρεται στο μέρος τοποθέτησης των ληγμένων ή μη χρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών προϊόντων.

**13. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ » ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ αν υπάρχουν.**

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση – Να διατίθεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή.

**14 .ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ « ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»**

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

**15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

FATRO S.p.A. Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Italy.

**16. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

A.A.K.: 12313

**17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

## ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

### 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

CALCIO PH ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, άλογα, χοίρους, πρόβατα, αίγες, κουνέλια, σκύλους, γάτες

### 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

#### Σύνθεση

#### Ποσότητα

Κάθε ml περιέχει:

#### Δραστικά συστατικά:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Calcium gluconate              | 200 mg  |
| Phosphoryl colamine            | 2,54 mg |
| Magnesium chloride hexahydrate | 3,34 mg |

#### Έκδοχα:

Sorbitol  
Sodium methyl parahydroxybenzoate  
Sodium propyl parahydroxybenzoate

### 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο διάλυμα

### 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250 ml

### 5. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ(ΤΑ) ΟΠΟΙΟ(Α) ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Βοοειδή, άλογα, χοίροι, αίγες, πρόβατα, κουνέλια σκύλοι και γάτες.

### 6. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Επιλόχεια πάρεση, παραπληγία πριν και μετά τον τοκετό, πυρετός μεταφοράς, αλλεργίες, ως γενικό τονωτικό.

### 7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Βοοειδή, άλογα:                                  | 250ml/ζώο    |
| Μόσχοι, πουλάρια, χοίροι, αίγες, πρόβατα:        | 50-150ml/ζώο |
| Χοιρίδια, αμνοί, ερίφια, κουνέλια σκύλοι, γάτες: | 15-50 ml/ζώο |

- Χορηγείται με αργή υποδόρια, ενδοφλέβια, ενδοπεριτοναϊκή ή ενδομυϊκή έγχυση. Επαναλαμβάνετε σύμφωνα με τη συμβουλή του κτηνιάτρου.

### 8. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας: μηδέν μέρες

Γάλα: μηδέν μέρες

**9. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ) ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ**

Καμία.

**10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ**

ΛΗΞΗ (μήνας/έτος)

**11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Φυλάσσεται μακριά από το φως και πηγές θερμότητας.

Διάρκεια ζωής: 5 χρόνια όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις συνθήκες φύλαξης στην αρχική του συσκευασία.

Η μεγαλύτερη περίοδος χρήσης μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη είναι 28 μέρες.

**12. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν**

Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον. Το αχρησιμοποίητο προϊόν ή το άχρηστο υλικό πρέπει να καταστρέφεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας. Το μη χρησιμοποιημένο υλικό πρέπει να μεταφέρεται στο μέρος τοποθέτησης των ληγμένων ή μη χρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών προϊόντων.

**13. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ » ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ αν υπάρχουν.**

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση – Να διατίθεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή

**14. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ « ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»**

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

**15. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

FATRO S.p.A. Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Italy.

**16. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

A.A.K.: 12313

**17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**



## **B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

**CALCIO PH** - ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, άλογα, χοίρους, πρόβατα, αίγες, κουνέλια, σκύλους, γάτες

### **1.ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός:

FATRO S.p.A. Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Italy

### **2.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

**CALCIO PH** - ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, άλογα, χοίρους, πρόβατα, αίγες, κουνέλια, σκύλους, γάτες

### **3.ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)**

**Σύνθεση**

**Ποσότητα**

Κάθε ml περιέχει:

#### **Δραστικά συστατικά:**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Calcium gluconate              | 200 mg  |
| Phosphoryl colamine            | 2,54 mg |
| Magnesium chloride hexahydrate | 3,34 mg |

#### **Έκδοχα:**

Sorbitol  
Sodium methyl parahydroxybenzoate  
Sodium propyl parahydroxybenzoate

### **4.ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Επιλόχεια πάρεση, παραπληγία πριν και μετά τον τοκετό, πυρετός μεταφοράς, αλλεργίες, ως γενικό τονωτικό.

### **5.ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Η χορήγηση ασβεστίου αντενδεικνύεται κατά την διάρκεια θεραπείας με δακτυλίτιδα.

### **6.ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Καμία γνωστή.

### **7.ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Βοοειδή, άλογα, χοίροι, αίγες, πρόβατα, κουνέλια, σκύλοι, γάτες.

## **8.ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Βοοειδή, άλογα                                  | 250ml/ ζώο   |
| Μόσχοι, πουλάρια, χοίροι, αίγες, πρόβατα        | 50-150ml/ζώο |
| Χοιρίδια, αμνοί, ερίφια, κουνέλια σκύλοι, γάτες | 15-50ml/ζώο  |

## **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Χορηγείται με αργή υποδόρια, ενδοφλέβια, ενδοπεριτοναϊκή ή ενδομυϊκή έγχυση. Επαναλαμβάνετε σύμφωνα με τη συμβουλή του κτηνιάτρου

## **10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Κρέας: μηδέν μέρες

Γάλα: μηδέν μέρες

## **11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Φυλάσσεται μακριά από το φως και πηγές θερμότητας.

Διάρκεια ζωής: 5 χρόνια όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις συνθήκες φύλαξης στην αρχική του συσκευασία.

Η μεγαλύτερη περίοδος χρήσης μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη είναι 28 μέρες.

## **12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Καμία.

## **13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ,ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον. Το αχρησιμοποίητο προϊόν ή το άχρηστο υλικό πρέπει να καταστρέφεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας. Το μη χρησιμοποιημένο υλικό πρέπει να μεταφέρεται στο μέρος τοποθέτησης των ληγμένων ή μη χρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών προϊόντων.

## **14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

14/02/2023

## **15.ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ:

N.A. CHANCE TRADING

60, Demokratias Str. Shop 1

2034, Strovolos, NICOSIA\_CYPRUS

Tel: +35722495992-94