

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/99/0934

Longosona

1 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, aitām un zirgiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN
ADRESE**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Industrial Veterinaria, S.A.-Invesa

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Spānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Longosona

1 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, aitām un zirgiem

Dexamethasone isonicotinate

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viens ml satur:

Aktīvā viela: deksametazons deksametazona izonikotināta veidā 1 mg

4. INDIKĀCIJAS

-Liellopi, cūkas, aitas un zirgi: Iekaisumi, ko izraisījušas infekcijas, alerģijas, traumatisms vai citi iemesli. Cirkulārais šoks un kolapss.

-Liellopi: ketoze.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja ir bakteriālas slimības bez vienlaicīgas antibiotiku terapijas, sēnīšu vai vīrusu infekcijas, nieru vai aknu nepietiekamība, nosprostojuša izraisīta sirds mazspēja, osteoporoze un kaulu lūzumi, cukura diabēts, deģeneratīvas acu slimības vai radzenes čūlas, hiperadrenokorticisms (Kušinga slimība).

Nelietot dzīvniekiem, kas tiek imunoloģiski ārstēti.

Svarīgs atgādinājums: Par neatliekamas terapijas piemērošanu kontraindicētos gadījumos izlemj veterinārārsts.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Laktējošiem dzīvniekiem var īslaicīgi samazināties piena produkcija.

Deksametazons var maskēt infekciju simptomus, piemēram, drudzi, slābanumu, ēstgribas zudumu.

Paaugstināta uzņēmība pret infekcijām imūnsistēmas nomākuma dēļ.

Lēnāka brūču dzīšana.

Var būt muskuļu vājums.

Zirgiem zāļu deva lielāka par 5 mg var izraisīt letargiju, kas izzūd 24 stundu laikā. Dažos gadījumos var attīstīties laminīts.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas, aitas un zirgi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Liellopi, cūkas, aitas un zirgi: 0,2-0,8 ml LONGOSONA uz 10 kg ķermeņa masas (ekvivalenti 0,02-0,08 mg deksametazona/kg ķermeņa masas) kā vienreizēja deva. Ja nepieciešamas, pēc 10-14 dienām devu var atkārtot.

Intramuskulārā vai subkutānā ceļā.

Pirms lietošanas labi sakratīt.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav piemērojami.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena.

Nedrīkst lietot zirgiem, ko lieto patēriņam cilvēku pārtikā.

Nedrīkst lietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Infekciju vai parazitāru slimību gadījumā lietot kopā ar specifiskām antibiotikām vai pretparazītu līdzekļiem.

Nelietot sievietēm grūsnības pēdējā trimestrī.

Neievadīt vienlaicīgi ar pretdiabēta līdzekļiem, barbiturātiem, kālija saturu samazinošiem diurētiskiem līdzekļiem, indometacīnu, salicilātiem un antihistamīna līdzekļiem.

Nelietot vienlaicīgi ar citiem kortikosteroīdiem.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

23/04/2009

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles
Lietošanai dzīvniekiem

Iepakojuma izmēri: 10 ml un 50 ml.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.