

**ETIKETTERING****GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****{doos met 1 flacon à 30, 50 of 100 ml}****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ceporex Injectie, 180 mg/ml  
Suspensie voor injectie  
Suspension injectable  
Injektionssuspension

Cefalexine/Cephalexine

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)**

Cefalexine (als cefalexine natrium) 180 mg/ml – gehydrateerde castorolie – gefractioneerde kokosolie  
Céfaléxine (sous forme de céfaléxine sodique) 180 mg/ml – Huile de ricin hydratée – Huile de coco fractionnée  
Cephalexine (als Cephalexinenatrium) 180 mg/ml - hydratiertes Castoröl - fraktioniertes Kokosöl

**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Suspensie voor injectie.  
Suspension injectable.  
Injektionssuspension.

**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

30 ml  
50 ml  
100 ml

**5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Runderen, honden en katten.  
Bovins, chiens et chats.  
Rinder, Hunde und Katzen.

**6. INDICATIE(S)**

**Runderen:** Metritis, interdigitale dermatitis, wonden en abscessen, septicemische mastitis.

**Honden en katten:** Infecties van de luchtwegen, het urogenitaal stelsel, de huid en de zachte weefsels en het maagdarmkanaal.

**Bovins:** Métrite, dermatite interdigitale, blessures et abcès, traitement de mastite septicémique.

**Chiens et chats:** Infections des voies respiratoires, des voies urinaires, du système gastro-intestinal, de la peau et d'infections localisées dans les tissus mous.

**Rinder:** Metritis, interdigitale Dermatitis, Wunden und Abszessen, septische Mastitis.

**Hunde und Katzen:** Infektionen der Luftwege, der Harnwege, der Haut, der Weichteilen und Magen-Darmkanal.

**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramusculaire of subcutane toediening.  
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Voie intramusculaire ou sous-cutanée.  
Lire la notice avant utilisation.

Intramuskuläre oder subkutane Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WACHTTIJD**Wachttijd - Runderen:

- Melk: nul dagen
- Vlees en slachtafval: 19 dagen

Temps d'attente - Bovins :

- Lait : zéro jour
- Viande et abats : 19 jours

Wartezeit - Rinder:

- Milch: Null Tage
- Essbare Gewebe: 19 Tage

**9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK**

Accidentele (zelf-) injectie is gevaarlijk - Lees vóór gebruik de bijsluiter.  
L'(auto-)injection accidentelle est dangereuse - Lire la notice avant utilisation.  
Eine versehentliche (Selbst-) Injektion ist gefährlich - Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP.: {maand/jaar}

**11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN**

Bewaren beneden 30°C.  
Beschermen tegen licht.  
Houdbaarheid na eerste aanprikken: 28 dagen.

À conserver en-dessous de 30 °C.  
Protéger de la lumière.  
Durée de conservation après premier prélèvement: 28 jours.

Nicht über 30°C lagern.  
Vor Licht schützen.  
Haltbarkeit nach dem ersten Anbruch: 28 Tage.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-  
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder Abfallmaterialien sollten entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN  
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET  
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

À usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

**14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE  
HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland

**16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V142965 (glas type I)

BE-V404494 (glas type II)

**17. PARTIJNUMMER FABRIKANT**

Lot: {nummer}

**GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD****{Flaconetiket}****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ceporex Injectie, 180 mg/ml  
Suspensie voor injectie  
Suspension injectable  
Injektionssuspension

Cefalexine/Cephalexine

**2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL**

Cefalexine (als cefalexine natrium) 180 mg/ml  
Céfalexine (sous forme de céfalexine sodique) 180 mg/ml  
Cephalexine (als Cephalexinenatrium) 180 mg/ml

**3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN**

30 ml  
50 ml  
100 ml

**4. TOEDIENINGSWEGEN:**

Intramusculaire of subcutane toediening.  
Voie intramusculaire ou sous-cutanée.  
Intramuskuläre oder subkutane Anwendung.

**5. WACHTTIJD**Wachttijd - Runderen:

- Melk: nul dagen
- Vlees en slachtafval: 19 dagen

Temps d'attente - Bovins :

- Lait: zéro jour
- Viande et abats: 19 jours

Wartezeit - Rinder:

- Milch: Null Tage
- Essbare Gewebe: 19 Tage

**6. PARTIJNUMMER**

Lot: {nummer}

**7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP.: { maand/jaar }

**8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Ad us. vet.

**9. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V142965 (glas type I)  
BE-V404494 (glas type II)