



## ETIQUETADO

### **DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR**

- Caja (1 vial de 5 dosis)**
- Caja (1 vial de 10 dosis)**
- Caja (1 vial de 50 dosis)**
- Caja (10 viales de 10 dosis)**
- Caja (10 viales de 25 dosis)**

### **1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

PARVOSUIN-MR

Emulsión inyectable para cerdos

### **2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS**

Por dosis (2 ml):

**Sustancias activas:**

Parvovirus Porcino inactivado, cepa NADL-2	≥ 1/32 IHA*
<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivado serotipo 2, cepa R32E11	≥ 37,1 ELISA **

\* Título de Inhibición de Hemoaglutinación

\*\* Título de anticuerpos en ratón expresado en unidades ELISA (densidad óptica)

**Adyuvantes:**

Parafina líquida	874,650 mg
Hidróxido de Aluminio (Al <sup>3+</sup> )	0,001 mg

**Excipientes:**

Tiomersal	0,200 mg
-----------	----------

### **3. FORMA FARMACÉUTICA**

Emulsión inyectable.

### **4. TAMAÑO DEL ENVASE**

- 5 dosis
- 10 dosis
- 50 dosis
- 10 viales de 10 dosis
- 10 viales de 25 dosis

**5. ESPECIES DE DESTINO**

Porcino, (cerdas jóvenes, cerdas adultas y verracos).

**6. INDICACIÓN(ES) DE USO**

Para la inmunización activa de las cerdas jóvenes, cerdas adultas y verracos (jóvenes y adultos) para prevenir la infección por el parvovirus porcino y para reducir los síntomas clínicos provocados por el Mal rojo del cerdo.

**7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello, detrás de la base de la oreja. Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPO DE ESPERA**

Cero días.

**9. ADVERTENCIAS ESPECIALES SI PROCEDEN**

La inyección accidental es peligrosa – lea el prospecto antes de usar.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado. No congelar. Proteger de la luz.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede**

Uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”**



Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Laboratorios Hipra, S.A.  
Avda. la Selva, 135.  
17170 Amer (Girona) España.  
Tel. (34) 972 43 06 60 - Fax (34) 972 43 06 61  
E-mail: [hipra@hipra.com](mailto:hipra@hipra.com)

**16. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2485 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO****Etiqueta vial de 25 dosis****Etiqueta vial de 50 dosis****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

PARVOSUIN-MR

Emulsión inyectable para cerdos

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS**Por dosis (2 ml):**Sustancias activas:**

Parvovirus Porcino inactivado, cepa NADL-2	≥ 1/32 IHA*
<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivado serotipo 2, cepa R32E11	≥ 37,1 ELISA **

\* Título de Inhibición de Hemoaglutinación

\*\* Título de anticuerpos en ratón expresado en unidades ELISA (densidad óptica)

**Adyuvantes:**

Parafina líquida	874,650 mg
Hidróxido de Aluminio (Al <sup>3+</sup> )	0,001 mg

**Excipientes:**

Tiomersal	0,200 mg
-----------	----------

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Emulsión inyectable.

**4. TAMAÑO DEL ENVASE**

25 dosis

50 dosis

**5. ESPECIES DE DESTINO**

Porcino, (cerdas jóvenes, cerdas adultas y verracos)

**6. INDICACIONES DE USO**

Para la inmunización activa de las cerdas jóvenes, cerdas adultas y verracos (jóvenes y adultos) para prevenir la infección por el parvovirus porcino y para reducir los síntomas clínicos provocados por el Mal rojo del cerdo.

**7. MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello, detrás de la base de la oreja.  
Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPO DE ESPERA**

Cero días.

**9. ADVERTENCIAS ESPECIALES SI PROCEDE(N)**

La inyección accidental es peligrosa – Lea el prospecto antes de usar.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {Mes/Año}

Período de validez después de abierto el envase primario: uso inmediato

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado. No congelar.

Proteger de la luz.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede**

Uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135.

17170 AMER (Girona) España.

MINISTERIO  
DE SANIDAD  
SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD

Agencia española de  
medicamentos y  
productos sanitarios



Tel. (972) 430660 - Fax (972) 430661  
E-mail: [hipra@hipra.com](mailto:hipra@hipra.com)

**16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2485 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO****Etiqueta vial de 5 dosis****Etiqueta vial de 10 dosis****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

PARVOSUIN-MR

Emulsión inyectable para cerdos

**2. CANTIDAD DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS**Por dosis (2 ml):**Sustancias activas:**

Parvovirus Porcino inactivado, cepa NADL-2	≥ 1/32 IHA*
<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> inactivado serotipo 2, cepa R32E11	≥ 37,1 ELISA **

\* Título de Inhibición de Hemoaglutinación

\*\* Título de anticuerpos en ratón expresado en unidades ELISA (densidad óptica)

**Adyuvantes:**

Parafina líquida	874,650 mg
Hidróxido de Aluminio (Al <sup>3+</sup> )	0,001 mg

**Excipientes:**

Tiomersal	0,200 mg
-----------	----------

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

5 dosis

10 dosis

**4. VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello, detrás de la base de la oreja.  
Lea el prospecto antes de usar.

**5 TIEMPO DE ESPERA**

Cero días.

**6 NÚMERO DE LOTE**

Lote {número}

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

MINISTERIO  
DE SANIDAD  
SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD

Agencia española de  
medicamentos y  
productos sanitarios

CAD {Mes/Año}

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.



**m**

MINISTERIO  
DE SANIDAD  
SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD  
Agencia española de  
medicamentos y  
productos sanitarios