

BIJLAGE III
ETIKETTERING

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**BAYCOX****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Baycox 2,5%, 25 mg/ml drank
(Toltrazuril)

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml = 25 mg Toltrazuril

3. FARMACEUTISCHE VORM

Geneesmiddel tegen coccidiose voor oraal gebruik via het drinkwater.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml
of
1000 ml
of
5000 ml

5. DOELDIERSOORT(EN)

voor kip en kalkoen

6. INDICATIE(S)**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Geneesmiddel tegen coccidiose voor oraal gebruik via het drinkwater.
Dosering: zie bijsluiter.

Doseertabel - Tableau des dosages - Dosierungstabelle	
L.G.-PC-K.G. 1000 dieren- animaux-Tiere	Baycox 1000 dieren- animaux-Tiere (ml per dag per joui/pro Tag)
140	39
170	48
190	53
220	62
250	70
280	78
310	87
340	95
380	106
420	118
460	129
500	140
540	151
590	165
640	179
690	193
740	207
780	218
850	238
910	255
950	266
1000	280
1100	308
1200	336
1300	364
1400	392
1500	420
1600	448
1700	476
1800	504
1900	532
2000	560
3000	840
4000	1120
5000	1400
6000	1680
7000	1960

8. WACHTTIJD

Kip: 14 dagen.

Kalkoen: 16 dagen.

Eieren: Niet gebruiken bij vogels die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie (te) produceren. Niet gebruiken binnen zes weken vóór het begin van de legperiode.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Geen.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik
Voorschriftplichtig

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Duitsland

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V142694

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
BAYCOX**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Baycox 2,5%, 25 mg/ml drank

(Toltrazuril)

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml = 25 mg Toltrazuril

3. FARMACEUTISCHE VORM

Geneesmiddel tegen coccidiose voor oraal gebruik via het drinkwater.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml

of

1000 ml

of

5000 ml

5. DOELDIERSOORT(EN)

voor kip en kalkoen

6. INDICATIE(S)**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Geneesmiddel tegen coccidiose voor oraal gebruik via het drinkwater.

Dosering: zie bijsluiter.

8. WACHTTIJD(EN)

Kip: 14 dagen.

Kalkoen: 16 dagen.

Eieren: Niet gebruiken bij vogels die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie (te) produceren. Niet gebruiken binnen zes weken vóór het begin van de legperiode.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Geen.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijdering: lees de bijsluiter.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik
voorschriftplichtig

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Duitsland

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V142694

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: