

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

{Faltschachtel für 20 Injektoren}

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Benestermycin - Suspension zur intramammären Anwendung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Ein Injektor (5 ml) enthält:

Framycetinsulfat	100,0 mg
Benethamin-Penicillin	280,0 mg
Penethamathydroiodid	100,0 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

20 x 5 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder (trockenstehende Milchkühe)

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur einmaligen intramammären Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 9 Tage

Milch: bei Anwendung früher als 35 Tage vor dem Abkalben: 36 Stunden ab Laktationsbeginn  
bei Anwendung innerhalb von 35 Tagen vor dem Abkalben: 37 Tage ab Verabreichung**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. ZULASSUNGSNR.**

Z.Nr.: 16761

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**

{5 ml Injektor}

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Benestermycin

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Framycetinsulfat	100,0	mg
Benethamin-Penicillin	280,0	mg
Penethamathydroiodid	100,0	mg

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}