



30. juni 2022

PRODUKTRESUMÉ

for

Banminth Vet., oral pasta til hest

0. D.SP.NR.
2906

1.0 VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Banminth Vet.

2.0 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Præparatet indeholder pr. g pasta:

Pyrantelemonat	439 mg
Methylparahydroxybenzoat E 218	1,05 mg
Propylparahydroxybenzoat E 216	0,3 mg

3.0 LÆGEMIDDELFORM
Oral pasta

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Dyrearter
Hest.

4.2 Terapeutiske indikationer
Infestationer med rundorm i mave-tarmkanalen hos hest.
Infestationer med bændelorm hos heste, dog ikke hos drægtige hopper.

4.3 Kontraindikationer
Drægtige hopper må ikke behandles for bændelorm (dobbel dosis). Produktet bør desuden ikke anvendes til meget svage og afkræftede dyr.

4.4 Særlige advarsler for hver dyreart
Følgende strategier bør undgås, da de kan medføre udviklingen af resistens overfor anthelmintica:

Ofte og gentagen brug af den samme type anthelmintica igennem en længere tidsperiode.

Underdosering, eventuelt grundet underestimering af kropsvægt, fejlagtig administration af produktet eller manglende kalibrering af doseringsanordning (hvis en sådan benyttes).

Mistanke om tilfælde af anthelmintica resistens undersøges ved hjælp af passende tests (f.eks. Faecal Egg Count Reduction Test). Hvis disse test indikerer resistens overfor et specifikt anthelmintica, anvendes et andet anthelmintica tilhørende en anden farmakologisk klasse og med en anden virkning.

4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

-

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

-

Andre forsigtighedsregler

-

4.6 Bivirkninger

Der har været sjældne tilfælde af diarre, hævelser i huden eller koliksymptomer efter administration af Banminth Vet. oral pasta. Disse reaktioner optræder i reglen indenfor 12-24 timer og er af forbigående natur.

4.7 Drægtighed, diegivning eller æglægning

Se pkt. 4.3.

4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pyrantel, morantel og levamisol har lignende virkningsmekanismer. Af hensyn til risikoen for overdosering bør samtidig indgift af disse stoffer derfor undgås.

Pyrantel bør ikke anvendes sammen med piperazin, da deres virkningsmekanismer er antagonistiske.

4.9 Dosering og indgivelsesmåde

Rundorm: 1 gram pasta pr. 23 kg legemsvægt svarende til 1 sprøjte á 26 gram pasta pr. 600 kg hest.

Bændelorm: 1 gram pasta pr. 12 kg legemsvægt svarende til 1 sprøjte á 26 gram pasta pr. 300 kg. hest.

4.10 Overdosering

Ingen.

4.11 Tilbageholdelsestid

Tilbageholdelsestiden på slagtekroppen er 15 døgn.

5. FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0 Terapeutisk klassifikation

QP 52 AF 02

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Banminth Vet. pasta er et anthelmintikum der gives oralt til heste. Det aktive stof, pyrantel, tilhører gruppen tetrahydropyrimidiner og den anthelmintiske effekt udøver ved påvirkning af den neuromuskulære transmission gennem stimulation af de kolinerge neuroner.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Pyrantelembonat er tungt opløseligt, hvorfor absorption af pyrantel kun foregår i ringe udstrækning.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Methylparahydroxybenzoat E 218

Natriumalginat

Propylparahydroxybenzoat E 216

Renset vand

Silica, kolloid vandfri

Sorbitol syrup

6.2 Uforlideligheder

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

3 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5 Emballage

Doseringsprøjte á 26 g pasta.

6.6 Særlige forsigtighedsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Animal Health ApS

Øster Alle 48

2100 København Ø

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

06998

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. maj 1977

- 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN**
30. juni 2022
- 11. UDLEVERINGSBESTEMMELSE**
BP