

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА  
КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ №0022-1827**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

Болфо противопаразитна каишка за малки кучета и котки  
Bolfo® collar for small dogs and cats

**2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ**

**Активна субстанция:**

Propoxur                    98,7 mg/g

Всяка каишка Bolfo collar for small dogs and cats с дължина 38 см и тегло 12,5 g, съдържа 1,23 g пропрохур.

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

**3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА**

Противопаразитна каишка.

**4. КЛИНИЧНИ ДАННИ**

**4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП**

Кучета и котки.

**4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни**

За профилактика и лечение на опаразитяване с бълхи и кърлежи при кучета и котки.

**4.3 Противопоказания**

Да не се използва при животни с механична обструкция на храносмилателния тракт или пикочните пътища, бронхиална астма или други белодробни и сърдечносъдови заболявания, тъй като карбаматите могат да предизвикват контракция на гладката мускулатура.

Да не се използва при кученца под 3-месечна възраст.

Да не се използва при животни с кожни увреждания.

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

**4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП**

Няма.

**4.5 Специални предпазни мерки при употреба**

Децата трябва да избягват контакт с животни, носещи кайшката.

Да се съхранява далеч от храна и фураж.

Кайшката да не се използва за игра, в частност от деца.

Кайшката да не се дъвче или смуче, в частност от деца.

#### Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Бълхите могат да бъдат междинен гостоприемник на тении, поради това е препоръчително да бъдат прилагани и продукти за вътрешно обезпаразитяване. За ефективен контрол на бълхите е важно да бъде обработена и средата, заобикаляща кучето, с подходящ одобрен инсектицид срещу ларвните стадии.

#### Специални предпазни мерки за лицата, прилагачи ветеринарномедицински продукт на животните

Да се избягва контакт с очите и кожата.

Да не се пие, яде или пуши по време на работа с продукта.

След работа с кайшката, ръцете да се измиват старательно с вода и сапун.

Хора с установена свръхчувствителност към активната субстанция Propoxur или към някой от ексципиентите трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Този ветеринарномедицински продукт съдържа карбамат (propoxur). При симптоми на отравяне, моля потърсете медицинска помощ.

#### **4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)**

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1 000 животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10 000 животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 животни, включително изолирани съобщения).

В много редки случаи на мястото на приложение могат да се появят реакции, като сърбеж, зачервяване, лезии и загуба на козина.

В много редки случаи някои животни могат да получат лек сърбеж или зачервяване на кожата след поставяне на кайшката.

Симптоми като повръщане, диария или отделяне на слюнка могат да се появят много рядко след попадане на продукта в устата.

#### **4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене**

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност.

Активната субстанция не е класифицирана като ембриотоксична, тератогенна или като репродуктивно токсична, поради което не се очакват такива ефекти при бременни или кърмещи животни.

#### **4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие**

Не са известни.

#### **4.9 Доза и начин на приложение**

Само за външно приложение!

Кайшката е предназначена за употреба при кучета с телесна маса под 10 kg и котки (<10 kg).

Каишката е ефективна в продължение на 4 месеца срещу бълхи и 10 седмици срещу кърлежи. Каишката е ефективна срещу бълхи и кърлежи ако се носи постоянно.

Бълхите върху кучето умират за няколко часа след поставянето на каишката. Кърлежите, смучещи кръв умират приблизително за един ден. Мъртвите кърлежи падат от кучето или могат да бъдат отстранени лесно.

Кърлежите, попаднали върху кучето ще бъдат убити и ще паднат в рамките на 72 часа, обикновено без да са смукали кръв. Прикрепянето на единични кърлежи не е изключено.

Поради тази причина, предаването на заразни заболявания от кърлежи не може да бъде напълно изключено при неблагоприятни условия.

Загубата на активност може да бъде проверена, като се надраска повърхността на каишката с остръ метален предмет. Ако мястото на надраскването е бяло на цвят, каишката е все още активна. В противен случай, каишката трябва да бъде заменена с нова.

#### Съвет за правилно приложение

Извадете противопаразитната каишка от опаковката и я развойте.

Уверете се, че няма остатъци от пластмасовите конектори от вътрешната ѝ страна.

Поставете каишката около врата на животното без да я стягате прекалено (трябва да е възможно да се поставят два пръста между каишката и врата на животното).

Изтеглете остатъка от каишката през халката и отрежете излишната част на 2 см от халката.

Правилно поставената каишка трябва да се проверява и регулира периодично, особено при млади животни.

Оптималният ефект от действието на каишката се достига 24 часа след поставянето ѝ на врата на животното. Продължителността и ефикасността на действие на каишката зависят от дълбината и състоянието на козината, от активността на животното и степента на опаразитяване.

Когато козината на животното е замърсена, е препоръчително то да бъде изкъпано преди поставяне на каишката. Каишката е водоустойчива, но не се препоръчва животното да се къпе с нея. В такива случаи е добре каишката да се свали и след подсушаване на козината да се постави отново.

Освен бълхите нападнали кучето, заобикалящата среда също може да е заразена с яйца, ларви и какавиди на бълхи. От тях могат да се развият нови бълхи. Поради тази причина е важно да се осъществява ефективен контрол на тези ранни стадии от развитието на паразитите в непосредственото обкръжение на кучето, посредством прилагането на подходящ, разрешен инсектицид.

#### **4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо**

Поради естеството на фармацевтичната форма, предозирането е невъзможно.

При случайно поглъщане или дъвчене на каишката е възможно да се появят симптоми на карбаматно отравяне, като повищено слюноотделение, свиване на зениците, повръщане и диария. При клинични признания на карбаматно отравяне се прилага симптоматично лечение и антидот атропин, интравенозно.

#### **4.11 Карантен срок (карентни срокове)**

Не е приложимо.

### **5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ**

Фармакотерапевтична група: Несистемни инсектициди – карбамати.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QP53AE02.

#### **5.1 Фармакодинамични свойства**

Propoxur е карбаматен инсектицид с ниска токсичност при бозайниците, който бързо се метаболизира и не се натрупва в тъканите.  
Инхибира холинестеразата, което е относително бързо обратимо.

## 5.2 Фармакокинетични особености

Активната субстанция се освобождава постоянно от кашката.  
Propoxur не се абсорбира от кожата.

Основните метаболити са определени като O-hydroxyphenyl N-methylcarbamate и 2-isopropoxyphenol, крайния метаболит, който се отделя с урината е glucuronide. Урината е вероятният основен път за екскреция на това съединение.

### Влияние върху околната среда

Този продукт е силно токсичен за водни организми, птици и пчели.  
Да не се допуска кучета с поставени кашки да плуват във водни басейни, в които има водни организми.  
Този продукт може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.  
Опаковката да не се използва повторно. Празните опаковки трябва да бъдат унищожени или изхвърлени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

## 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

### 6.1 Списък на експицентите

N-бутил-адипат  
Пропилен гликол дикаприлокапрат  
Соево масло  
Стеаринова киселина  
Железен оксид (Е 172)  
Титаниев диоксид (Е171)  
Поливинилхлорид

### 6.2 Несъвместимости

Да не се прилага едновременно с други инсектициди.

### 6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 5 години.

### 6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

### 6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Картонена кутия с 1 кашка във фолиева опаковка.

### 6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Да не се замърсяват реки, речни корита, язовири, резервоари и други водоизточници с продукта.  
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

**7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Германия

**8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

0022-1827

**9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

Дата на първото издаване на разрешението за търговия: 11.09.2007.

Дата на последно подновяване на лиценз за употреба: 17.07.2012

**10. ДАТА НА ПОСЛЕДНата РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

01/2024

**ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА**

Не е приложимо.

Без лекарско предписание.

**Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ**  
**ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**