

PROSPECTO

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

DIVASA-FARMAVIC, S.A.
Ctra. Sant Hipòlit, km 71
08503 GURB – VIC
(Barcelona)

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

TABERNIL LEVAMISOL

3. DENOMINACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Composición por ml: Levamisol (hidrocloruro) 75 mg; Benzoato de sodio (E-211), 1 mg; metabisulfito de sodio (E-223). 0,5 mg; edetato de disodio, 0,5 mg.

Forma farmacéutica: Solución para administración en el agua de bebida.

4. INDICACIÓN(ES)

Pájaros ornamentales: Tratamiento de nematodosis gastrointestinales producidas por *Ascaridia columbae*, *Capillaria* spp., *Heterakis* spp., *Amidostomum* spp. sensibles al levamisol.

5. CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa y/o algún excipiente.
No usar en kiwis.

6. REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y GRAVEDAD)

No se han descrito.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

7. ESPECIES DE DESTINO

Aves (pájaros ornamentales).

8. DOSIFICACIÓN PARA CADA ESPECIE, VÍA(S) Y FORMA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral, administración en el agua de bebida.

Dosis: 20-25 mg. de levamisol/kg. p.v (equivalente a 2 gotas por cada 40 ml de agua), durante 1 día.

9. RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

10. TIEMPO DE ESPERA

No procede

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no precisa condiciones especiales de conservación.

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 3 meses.

Período de validez después de su disolución según las instrucciones: 24 horas.

12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Precauciones especiales para su uso en animales

Ninguna.

Precauciones especiales que deberá adoptar la persona que administre el medicamento a los animales

Las personas con hipersensibilidad conocida al levamisol deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Manipular el medicamento con cuidado para evitar el contacto con la piel y los ojos tomado precauciones específicas:

- Lavarse las manos tras utilizar el medicamento.
- Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No administrar compuestos organofosforados o desde 14 días antes hasta 14 días después de la administración de levamisol.

Sobredosificación (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos)

Los síntomas de intoxicación por sobredosificación son similares los de la intoxicación por organofosforados: Hiperexcitabilidad y ligeros temblores musculares.

Incompatibilidades

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBEN OBSERVARSE AL ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, SUS RESIDUOS

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

11 de junio de 2013

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Presentación: Caja con un frasco conteniendo 20 ml.

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños.

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al titular de la autorización de comercialización.

Uso veterinario – Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Registro N°: 63 ESP