

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

INSPECTOR QUADRO C

разтвор за прилагане върху ограничен участък за възрастни кучета и кученца

2. Състав

Активни вещества в ml:

Fipronil	107 mg
Praziquantel	42.8 mg
Pyriproxyfen	21.4 mg
Moxidectin	26.75 mg

Помощни вещества:

Качествен състав на помощните вещества и другите съставки	Количествен състав, ако тази информация е важна с оглед на правилното прилагане на ветеринарния лекарствен продукт
N-methylpyrrolidone	321 mg

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Възрастни кучета и кученца.

4. Показания за употреба

INSPECTOR QUADRO C е предназначен за кучета и кученца за лечение и профилактика на инвазии от кръвосмучещи насекоми, демодекозна краста, заразяване с ушни акари, саркоптозна краста, инвазии на иксодидни кърлежи, стомашно-чревни нематодози (токсокароза, токскаридоза, унцинариоза, анкилостомоза), цестодози (инвазии с тении, дипилидиоза, ехинококоза), комплексни нематодно-цестодни инвазии, както и за профилактика на диروفилариоза.

Комбинацията от фипронил, празиквантел, моксидектин и пирипроксифен, които са част от продукта, осигурява неговия широк спектър на антипаразитно действие срещу бълхи (*Ctenocephalides canis*), смучещи въшки (*Linognathus setosus*), въшки (*Trichodectes canis*), саркоптитни кърлежи (*Sarcoptes scabiei*, *Otodectes cynotis*), демодекозни кърлежи (*Demodex canis*) и иксодидни кърлежи (*Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.); ларвна и зряла фаза на нематодно развитие на *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*; цестоди (*Taenia* spp., *Echinococcus granulosus*, *Dipylidium caninum*), ларви (микрофиларии) на *Dirofilaria immitis* и *Dirofilaria repens*, паразитиращи при кучета.

5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активните вещества или към някои от помощните вещества.

Да не се използва при кученца на възраст под 7 седмици.

Да не се използва при заразени или изтощени кучета.

6. Специални предупреждения

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

INSPECTOR QUADRO C не е предназначен за продуктивни животни.

Не е разрешено прилагането на продукта в ушите (при ушна краста), когато тъпанчевата мембрана е перфорирана.

Употребата на продукта при кученца от породи Коли, Бобтейл и Шелти, чувствителни към макроциклични лактони и животни с тегло под 1 kg трябва да се извършва под наблюдението на ветеринарен лекар.

Продуктът да не се прилага върху мокра или увредена кожа.

Животното да не се къпе четири дни след третирането.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

При работа с INSPECTOR QUADRO C трябва да се спазват общите правила за лична хигиена и безопасност на труда. Не пушете, не пийте и не яжте, докато работите с продукта. След приключване на работата внимателно измийте ръцете си със сапун и топла вода. Не галете и не оставяйте животното близо до малки деца в продължение на 2 дни след третиране.

Хора с установена свръхчувствителност към празиквантел, фипронил, пирипроксифен и моксидектин трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

При случаен контакт с кожата или лигавиците на очите, измийте замърсените места с голямо количество вода. При възникване на алергична реакция или при случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да се прилага от бременни жени или от жени, за които се предполага, че може да са бременни. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи от жени в детеродна възраст, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

Бременност и лактация:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана при кучета по време на бременност и лактация или при животни, предназначени за разплод. Лабораторните проучвания при зайци и плъхове с помощното вещество N-метил пиролidon са доказали фетотоксичност. рилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Не използвайте INSPECTOR QUADRO C заедно с други антипаразитни продукти, поради възможно взаимно засилване на токсичността.

Предозиране:

В случай на предозиране може да се наблюдава депресивно състояние, прекомерно слюноотделяне, мускулен тремор и повръщане. В тези случаи продуктът се отмива от тялото с вода и детергент и се прилага симптоматична терапия.

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с други антипаразитни продукти, поради възможно взаимно засилване на токсичността.

7. Неблагоприятни реакции

Възрастни кучета и кученца.

Редки (1 до 10 на 10 000 третиран животни):	Индивидуални кожни реакции (зачервяване, сърбеж)*
--	---

* Изчезват сами и не изискват лечение.

Няма неблагоприятни реакции и усложнения при употреба на INSPECTOR QUADRO C в съответствие с препоръчаните метод и начин на приложение. В случай на алергични реакции при животно, чувствително към активните вещества или помощните вещества на продукта,

продуктът трябва да се отмие обилно с вода и детергент и да се изплакне обилно с течаща вода и, ако е необходимо, да се приложат антихистамини и симптоматична терапия.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия или местния представител на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване:

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

INSPECTOR QUADRO C се използва при кучета, като се прилага върху суха, здрава кожа, в дозите, посочени в таблицата:

Телесна маса (т.м.)	Доза на продукта (номиналния обем на пипетата), ml
1-4 kg	0.4
4-10 kg	1.0
10-25 kg	2.5
25-40 kg	4.0
40-60 kg	6.0

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

При лечение на кучета с телесна маса над 60 kg, продуктът се прилага в доза от 0,1 ml/kg телесна маса, като се използва комбинация от пипети от различни опаковки. При лечение на кучета с телесна маса под 1 kg продуктът се прилага в доза от една капка разтвор (0.05 ml) на 0.5 kg телесна маса.

За да се елиминират бълхи, смучещи въшки, въшки и иксодидни кърлежи, приложете продукта (прилагане върху ограничен участък) директно върху кожата на места, недостъпни за животно за облизване – между лопатките в основата на шията. При третиране на големи кучета, приложете съдържанието на пипетата на 3-4 места. Третирайте животните веднъж, за да предотвратите повторна инвазия третирайте веднъж на всеки 4-6 седмици през целия сезон на активност на ектопаразити.

За да предотвратите повторна инвазия на бълхи, заменете или третирайте постелките на животните с одобрени инсектициди в съответствие с инструкциите за употреба.

Акарицидният ефект на продукта се проявява след 12-24 часа, като се има предвид, че третирането трябва да се извърши не по-късно от 24 часа преди очакваното пускане на животно на открити места, където има вероятност да бъдат изложени на кърлежи (паркове, градини, гори).

За да се премахнат иксодидните кърлежи, прикрепени към тялото на животно, нанесете 1 капка INSPECTOR QUADRO C на кърлеж в мястото на прикрепването му към кожата. Ако в продължение на 20 минути кърлежът не падне спонтанно, внимателно го отстранете от кожата с пинсета и унищожете.

За лечение на отодектоза, почистете ушния канал от струпеи и корички, след това приложете във всяко ухо по 3-5 капки от продукта (необходимо е накапване и в двете уши), сгънете ушната раковина наполовина и масажирайте основата. Останалият продукт от използваната пипета (спрямо т.м. на животното) се прилага върху кожата между лопатките. Извършете 2-3 третираня с интервал от 7-10 дни. В случай на усложнение на отит се прилагат антимикробни и противовъзпалителни продукти.

Ако е необходимо, повторете курса на лечение след 1 месец при микроскопски контрол.

Ако тъпанчевата мембрана е перфорирана, нанесете продукта върху кожата, между лопатките в основата на шията в дозите, посочени в таблицата.

В случай на саркоптозна и демодекозна краста, приложете INSPECTOR QUADRO C в тънък слой върху местата на тялото след почистване от струпеи, покривайки границата на здрава кожа до 1 cm² в доза от 0,1 ml/kg телесна маса.

Извършете 2-4 третираия с интервал от 7-10 дни. Третирайте животни с обширни лезии на два етапа с интервал от 1 ден, като прилагате продукта върху засегнатите области първо върху едната и след това върху другата половина на тялото.

Препоръчва се лечението да се провежда комплексно, като се използват патогенетична и симптоматична терапия, до клиничното възстановяване на животното, което се потвърждава с два отрицателни резултата от микроскопски изследвания.

За дехелминтизиране на животните приложете INSPECTOR QUADRO C върху кожата в дозите, посочени в таблицата, за терапевтични цели - еднократно, а за превантивна цел - веднъж месечно.

За предотвратяване на дирофилариоза в засегнатите от болестта райони, прилагайте продукта през пролетно-лятно-есенния период: преди началото на летенето на комарите (носители на *D. immitis*) веднъж, след това веднъж месечно и последния път в рамките на един месец след приключване на летенето на насекомите.

INSPECTOR QUADRO C не унищожава зрели дирофиларии, но намалява броя на микрофилариите, циркулиращи в кръвта, и може да се прилага безопасно и при инвазирани животни.

10. Карентни срокове

Не е приложимо.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху картоната или пластмасова пипетата след срока на годност. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като активните вещества може да бъдат опасни за риби и други водни организми.

Продуктът е токсичен за зайци, пчели, риби и други хидробионти.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички национални системи за събиране, приложими за съответния ветеринарен лекарствен продукт.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска без лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

№ 0022-3129

Пластмасови пипети от 0.4, 1.0, 2.5, 4.0 и 6.0 ml.

Пипетите се опаковат в полимерни блистери заедно с етикет и се поставят във външна картонена опаковка, заедно с листовка.

Размер на опаковката:

1, 2, 3, 4, 6, 8 или 10 пипети x 0.4 ml

1, 2, 3, 4, 6, 8 или 10 пипети x 1.0 ml

1, 2, 3, 4, 6, 8 или 10 пипети x 2.5 ml

1, 2, 3, 4, 6, 8 или 10 пипети x 4.0 ml

1, 2, 3, 4, 6, 8 или 10 пипети x 6.0 ml

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

04/2024

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партии и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД
4023 Пловдив, България
ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Телефон: +359 897 84 39 18
Email: info@vepco.bg

Местни представители и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

"ВЕТ ПРО КОМЕРС" ООД

4003 Пловдив, България
ул. "Васил Левски" №258
тел.: +359 897 84 39 18
Email: info@vepco.bg

За всякаква информация относно този ветеринарен лекарствен продукт, моля, свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за търговия.

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР