

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/97/0579
OTIBIOVIN ausu pilieni, šķīdums suņiem un kaķiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN
ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bioveta, a.s.,
Komenského 212,
Ivanovice na Hané,
Čehijas Republika

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

OTIBIOVIN ausu pilieni šķīdums suņiem un kaķiem

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml šķīduma satur -

Aktīvās vielas:

Triamcinolona acetonīds	0,5 mg
Salicilskābe	5,0 mg
Gentamicīna sulfāts	2,0 mg
Karbetopendecīna bromīds	0,125 mg

4. INDIKĀCIJA(-S)

Ārējās auss ejas iekaisuma (*Otitis externa*) un virsējā dermatīta ārstēšanai, ko ierosina pret preparāta sastāvdaļām jutīgi mikroorganismi.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Ausu bungādiņas plīsums. Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām, pret palīgvielām vai pret kādu no papildvielām un kortikosteroīdiem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUS PARĀDĪBAS

Nav zināmas.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi.

**8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN
PAŅĒMIENA**

Ārstēšanas sākumā dzirdes kanālā iepilina 4 – 5 pilienus *Otibiovin* 3 – 4 reizes dienā, pēc 3 dienām 2 – 3 reizes dienā.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pēc šķīduma aplikācijas ieteicams pamasēt auss apvidu, lai veicinātu dziļāku zāļu iekļūšanu audos. Ja auss kanāls ir netīrs vai krevelains, pirms *Otibiovin* aplikācijas vēlams atmieķšķēt netīrumus un noņemt kreveles ar pinceti.

Ārstēšanas kurss parasti ilgst 5 – 7 dienas, maksimums 12 dienas (vēl 3 dienas pēc klīnisko simptomu izzušanas).

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

Aizliegts lietot produktīvajiem dzīvniekiem.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no gaismas.

Piezīme: Uzglabāšanas laikā šķīdums var kļūt nedaudz duļķains vai veidoties nogulsnes, kas izzūd pēc flakona saskalināšanas. Šādas izmaiņas neietekmē *Otibiovin* iedarbības kvalitāti.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 12 dienas

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts iepakojuma marķējumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Šīs veterinārās zāles jāizlieto 12 dienu laikā pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas.

Veterinārām zālēm ir stingri noteiktas indikācijas, tās var lietot smagas infekcijas ārstēšanā, pamatojoties uz klīniski noteiktu un apstiprinātu diagnozi; uz ierosinātāju jutības pārbaudes testu rezultātiem un ņemot vērā mikroorganismu rezistenci pret biežāk lietojamām antibiotikām.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no šo zāļu saskares ar ādu, gļotādām un iekļūšanas acīs. Gadījumā, ja šīs zāles nokļuvušas uz ādas vai gļotādām, nekavējoši skalot tās ar lielu ūdens daudzumu un novilkt kontaminēto apģērbu, kurš ir tiešā saskarē ar ādu. Ja šīs zāles iekļuvušas acīs, skalot tās ar lielu ūdens daudzumu. Ja rodas acu kairinājums, meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Personām ar pastiprinātu jutību pret triamcinolonu, salicilskābi, gentamicīnu vai karbetopendecīna bromīdu šīs veterinārās zāles jālieto piesardzīgi.

Šo zāļu aplikācijas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt.

Mazgāt rokas pēc šo zāļu aplikācijas.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

06/2012

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lietošanai dzīvniekiem.