

## NAVODILO ZA UPORABO

### EURICAN DAPPi - L liofilizat in suspenzija za pripravo suspenzije za injiciranje za pse

#### 1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS  
29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francija

Izdelovalec, odgovoren za sprostitvev serije:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,  
Laboratoire Porte des Alpes  
Rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest, Francija

#### 2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EURICAN DAPPi - L liofilizat in suspenzija za pripravo suspenzije za injiciranje za pse

#### 3. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN

Vsak odmerek cepiva vsebuje:

##### - liofilizat

##### Zdravilne učinkovine:

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| • virus pasje kuge, oslavljen, vsaj          | 10 <sup>4,0</sup> TCID <sub>50</sub> |
| • adenovirus (CAV2), oslavljen, vsaj         | 10 <sup>2,5</sup> TCID <sub>50</sub> |
| • virus parvoviroze, oslavljen, vsaj         | 10 <sup>4,9</sup> TCID <sub>50</sub> |
| • virus parainfluence tip 2, oslavljen, vsaj | 10 <sup>4,7</sup> TCID <sub>50</sub> |

##### - suspenzija

Inaktivirana <i>Leptospira interrogans</i> serovar <i>canicola</i>	} q.s. za učinkovitost glede na monografijo
Inaktivirana <i>Leptospira interrogans</i> serovar <i>icterohaemorrhagiae</i>	} 447 Evropske Farmakopeje
aluminijev hidroksid	0,6 mg

#### 4. INDIKACIJA(E)

- Aktivna imunizacija proti pasji kugi, adenovirozi, parvovirozi, parainfluenca tip 2 infekcijam dihal in *Leptospira canicola*, *Leptospira icterhaemorrhagiae* leptospirozam.

Trenutno dostopni podatki seroloških študij in študij z izpostavitvijo povzročiteljem kažejo, da zaščita proti pasji kugi, adenovirozi in parvovirozi\* traja 2 leti po osnovnem programu cepljenja, ki mu je sledilo prvo letno ponovno cepljenje.

Vsaka odločitev za spremembo priporočenega programa cepljenja s tem cepivom mora biti sprejeta za vsako posamezno žival in mora upoštevati zgodovino že opravljenih cepljenj ter epidemiološko situacijo.

\*Zaščita proti pasjemu parvovirusu tip 2a, 2b in 2c je bila dokazana z izpostavljenostjo virusu (tip 2b) ali s serologijo (tip 2a in 2c).

#### 5. KONTRAINDIKACIJE

Niso znane.

## **6. NEŽELENI UČINKI**

- Redko se lahko takoj po cepljenju pojavita rahlo srbenje in bolečina na mestu dajanja. Pojavi se lahko prehodna oteklina ( $\leq 4$  cm), ki običajno izgine v 1- 4 dneh.
- Aluminijev hidroksid lahko občasno povzroči nastanek majhne in prehodne zatrdline na mestu dajanja cepiva.
- Podobno kot pri vseh cepivih je tudi pri tem izjemoma mogoča preobčutljivostna reakcija. Preobčutljivostne reakcije je potrebno zdraviti simptomatsko.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

## **7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Psi.

## **8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA**

Cepite z enim odmerkom (1 ml) subkutano v skladu z naslednjim razporedom:

### **Osnovno cepljenje:**

Dva odmerka, ločena v časovnem razmaku 4 tednov, od 7. tedna starosti dalje.

Ob sočasnem cepljenju z Boehringer Ingelheim cepivom proti steklini, je najnižja starost ob cepljenju 12 tednov.

V primeru da veterinar predvidi, da obstaja možnost visokega nivoja maternalnih protiteles in da je osnovno cepljenje zaključeno pred 16. tednom starosti, je priporočljivo dajanje še tretjega odmerka po 16. tednu starosti, vsaj 3 tedne po drugem odmerku osnovnega cepljenja.

### **Ponovno cepljenje:**

En odmerek 12 mesecev po končanem osnovnem cepljenju.

Psi morajo biti ponovno cepljeni z enim odmerkom cepiva vsaki dve leti po prvem letnem ponovnem cepljenju.

## **9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA**

Osnovni odmerek je 1 ml cepiva, ki ga pripravimo z mešanjem liofilizata in suspenzije.

Držite se običajnih načel antiseptice.

Uporabite sterilno iglo in opremo, ki naj ne bo kontaminirana z antiseptikom ali razkužilom.

Cepivo uporabite takoj po pripravi.

## **10. KARENCA**

Ni smiselno.

## **11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte in prevažajte pri temperaturi 2°C – 8°C (v hladilniku).

Zaščitite pred svetlobo. Cepivo ne sme zmrzniti.

## **12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)**

- Cepite le povsem zdrave živali, ki ste jim odpravili notranje zajedavce vsaj 10 dni pred cepljenjem.
- Ob visoki epidemiološki stopnji tveganja za leptospirozo je priporočljivo polletno pozitivno cepljenje.
- Držite se običajnih načel antisekse.
- Uporabite sterilno iglo in opremo, ki naj ne bo kontaminirana z antiseptikom ali razkužilom.
- Ni podatkov o varnosti ter učinkovitosti ob uporabi tega cepiva s katerim koli drugim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini. Zato se za uporabo tega cepiva pred ali po uporabi katerega koli drugega zdravila odločamo od primera od primera.
- Redko se lahko takoj po cepljenju pojavita rahlo srbenje in bolečina na mestu dajanja. Pojavi se lahko prehodna oteklina ( $\leq 4$  cm), ki običajno izgine v 1-4 dneh.
- Aluminijev hidroksid lahko občasno povzroči nastanek majhne in prehodne zatrdline na mestu dajanja cepiva.
- Podobno kot pri vseh cepivih je tudi pri tem izjemoma mogoča preobčutljivostna reakcija. Preobčutljivostne reakcije je potrebno zdraviti simptomatsko.

### **13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali v gospodinjske odpadke.

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

### **14. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODIL ZA UPORABO**

17.4.2020

### **15. DRUGE INFORMACIJE**

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom: Vetpromet d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana.