

**Wortlaut der für das Behältnis (Pipette) vorgesehenen Angaben**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bob Martin Clear Spot on 268 mg Lösung zum Auftropfen für große Hunde

**2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE**

268 mg

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

Lösung zum Auftropfen

**5. WARTEZEIT(EN)**

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B.:

**7. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

**8. VERMERK "FÜR TIERE"**

Für Tiere

**Wortlaut der für die äußere Umhüllung (PVC-Blisterfolie) vorgesehenen Angaben**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bob Martin Clear Spot on 268 mg Lösung zum Auftropfen für große Hunde  
Fipronil

**2. ZULASSUNGSHABER**

Bob Martin (UK) Ltd.

**3. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

**4. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B.:

**5. VERMERK "FÜR TIERE"**

Für Tiere

**Wortlaut der für die äußere Umhüllung (Faltschachtel) vorgesehenen Angaben**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bob Martin Clear Spot on 268 mg Lösung zum Auftropfen für große Hunde  
Fipronil

**2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

Enthält: 268 mg Fipronil

**3. DARREICHUNGSFORM**

Lösung zum Auftropfen

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1,2,3,4,5 oder 6 Pipetten

**5. ZIELTIERART(EN)**

Hund

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Zur Behandlung von Flohbefall (*Ctenocephalides* spp.) und Zeckenbefall (*Rhipicephalus sanguineus* und *Ixodes ricinus*).

Flöhe werden innerhalb von 24 Stunden abgetötet. Die insektizide Wirksamkeit gegen einen Neubefall mit adulten Flöhen hält bis zu 8 Wochen an.

Die akarizide Wirkung gegen Zecken (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus* und *Dermacentor reticulatus*) hält bis zu 4 Wochen an.

Zecken werden in der Regel innerhalb von 48 Stunden nach Kontakt mit Fipronil abgetötet. Wenn jedoch Zecken einiger Arten (*Dermacentor reticulatus*) zum Zeitpunkt der Behandlung bereits am Tier vorhanden sind, werden möglicherweise nicht alle innerhalb der ersten 48 Stunden nach dem Auftragen abgetötet.

Das Tierarzneimittel kann als Teil einer Behandlungsstrategie zur Kontrolle der Flohallergidermatitis (FAD) verwendet werden, sofern diese zuvor von einem Tierarzt diagnostiziert wurde.

**7. ART DER ANWENDUNG**


Nur zur äußerlichen Anwendung.

Die Tiere sollten vor der Behandlung genau gewogen werden.

Lokale Anwendung auf die Haut entsprechend dem Körpergewicht: 1 Pipette mit 2,68 ml für einen Hund mit einem Körpergewicht von 20 kg bis 40 kg.

Für Hunde mit mehr als 60 kg Gewicht zwei Pipetten mit je 2,68 ml verwenden.

Lesen Sie vor der Anwendung die vollständige Packungsbeilage einschließlich der Warnhinweise für Anwender.



1. Eine Pipette aus der Blisterpackung entnehmen. Die Pipette in einer aufrechten Position halten, den oberen Teil der Kappe abbrechen, wodurch die Pipette geöffnet wird.
2. Das Fell des Hundes scheiteln, sodass die Haut sichtbar wird. Die Pipettenspitze auf die Haut aufsetzen und die Pipette leicht zusammendrücken. An zwei Applikationsstellen am Rücken des Hundes je ungefähr die Hälfte des Inhalts auftragen. Die Applikationsstellen sollten vorzugsweise an der Basis des Kopfes und zwischen den Schulterblättern liegen. Die Pipette mehrmals drücken, um sicherzustellen, dass der Inhalt vollständig entleert wurde. Die Applikation der Lösung auf das Fell vermeiden und das Tierarzneimittel nicht in die Haut einreiben.
3. Die beschriebene Anwendung der Lösung verringert die Möglichkeit, dass das Tier die Lösung ableckt. Es muss darauf geachtet werden, dass sich die Haustiere nach der Behandlung nicht gegenseitig lecken.

## **8. WARTEZEIT**

Nicht zutreffend.

## **9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die vollständige Packungsbeilage einschließlich der Warnhinweise für Anwender.

Nicht bei Kaninchen anwenden!

## **10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

## **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Trocken und nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

AT: Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

DE: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammlstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Fipronil kann für Wasserorganismen schädlich sein. Deshalb darf das Tierarzneimittel oder der leere Behälter nicht in Teiche, Wasserläufe oder Kanäle gelangen.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS  
"ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS**

Pets Choice Healthcare Ltd  
38 Main Street  
Swords  
Co. Dublin  
Irland

**16. ZULASSUNGSNR.(N)**

DE: Zul.-Nr.: 401822.00.00

AT: Zul.-Nr.: 835086

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.: