

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Salicam, salv

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeained:

1 g salvi sisaldab:

kamprit 50 mg

tärpentiniõli 30 mg

salitsüülhapet 10 mg

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM

Salv.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Loomaliigid

Kõik loomaliigid.

4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Udara- ja lihasepõletike; kõõluse- ning kõõlusetupestõletike; liigese- ja närvipõletike toetav ravi.

4.3 Vastunäidustused

Mitte kasutada veritsevate haavade ja marrastustega nahal.

Mitte kasutada, kui esinevad leemendavad nahapõletikud ja ekseemid.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4 Erihoiatused

Ei ole.

4.5 Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimi manustamine võib põhjustada liha ja piima organoleptilisi muutusi.

Limaskestadele manustatuna põhjustab salv tugeva ärrituse.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele.

Ei rakendata.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Tiinetele ja lakteerivatele loomadele manustamine ei ole põhjustanud kõrvaltoimeid.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole teada.

4.9 Annustamine ja manustamisviis

Kanda salv põletikulisele piirkonnale ja hõõruda naha sisse 1...2 korda ööpäevas kuni põletikutunnuste kadumiseni. Ravikuuri pikkus sõltub haiguse iseloomust ja raskusastmest.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ravimi manustamisviisist tulenevalt ebatõenäoline.

4.11 Keeluaeg (-ajad)

Produktiivloomad: 0 päeva.

Lemmikloomad: ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: põletikuvastased preparaadid paikseks kasutamiseks
ATCvet kood: QM02AC99

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Salv on põletikuvastase ning mõõdukalt antimikroobse toimega.

Põletikuvastane toime tuleneb vereringe aktiveerumisest ning kudede ainevahetuse elavnemisest kampri ja tärpentiniõli toimele. Ühtlasi vähendab salv ka turset ja kudede valulikkust põletikukoldes. Nii kamper kui ka tärpentiniõli on mikroobidevastase toimega.

Salvi koostisesse kuuluv salitsüülhape on nõrga seentevastase toimega. Salitsüülhappel on samuti nahka pehmendav ja keratolüütiline toime. Salvi toime on lokaalne.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Vaseliin, tsetüülalkohol, emulgeeriv tsetostearüülalkohol (tüüp A), tahke parafiin, glütserool, puhastatud vesi.

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

500 g pakend - 1 aasta,
800 g pakend - 2 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida plastikpurk tihedalt suletuna.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Mitte lasta külmuda.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Pakend: 500 g või 800 g salvi plastikpurgis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Tallinna Farmaatsiatehase AS
Tondi 33
11316 Tallinn, Eesti
Tel.: 612 0201
Faks: 612 0330
e-post: farma@tft.ee

8. MÜÜGILOA NUMBER

1343

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

14.10.2005/17.02.2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai2014

TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: käsimüügiravim