

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING VERPAKKING VERMELD MOETEN WORDEN (LABEL OP FLACON)**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

READYCEF 50 mg/ml suspensie voor injectie voor varkens en runderen.

Ceftiofur (als ceftiofur hydrochloride)

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Ceftiofur (als ceftiofur hydrochloride) 50 mg/ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml

250 ml

5. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varken en rund

6. INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair injectie bij varkens en subcutaan injectie bij runderen.

Goed schudden voor gebruik

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJD

Varkens: (Orgaan) vlees: 5 dagen

Runderen: (Orgaan) vlees: 8 dagen.

Melk: nul dagen.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Penicillines en cefalosporinen kunnen soms ernstige allergische reacties veroorzaken.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: einde MM/ Jaar

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen
Na openen, gebruiken voor ...

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 25 ° C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren
Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN,
INDIEN VAN TOEPASSING**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – UDD - Op diergeneeskundig voorschrift

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Laboratorios Calier, S.A.
Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Spanje

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

NL: REG NL 106259
BE: BE-V367035

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Partij

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING VERMELD MOETEN WORDEN
(KARTONNEN DOOS)****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

READYCEF 50 mg/ml suspensie voor injectie voor varkens en runderen.
Ceftiofur (als ceftiofur hydrochloride)

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDE(E)L(EN)

Ceftiofur (als ceftiofur hydrochloride) 50 mg/ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml
250 ml

5. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varken en rund

6. INDICATIE(S)Varken:

Behandeling van de bacteriële luchtweginfecties, veroorzaakt door voor ceftiofur hydrochloride gevoelige *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* en *Streptococcus suis* .

Rund:

- Behandeling van de bacteriële luchtweginfecties, veroorzaakt door voor ceftiofur hydrochloride gevoelige *Mannheimia haemolytica* (vroeger: *Pasteurella haemolytica*), *Pasteurella multocida* en *Histophilus somni* (voormalig: *Haemophilus somnus*) .
- Voor de behandeling van acute interdigitale necrobacillose (panaritium, rotkreupel), veroorzaakt door voor ceftiofur hydrochloride gevoelige *Fusobacterium necrophorum* en *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*) .

Voor de behandeling van de bacteriële component van acute post-partum (puerperale) metritis, binnen 10 dagen na het afkalven, veroorzaakt door voor ceftiofur hydrochloride gevoelige *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* en *Fusobacterium necrophorum* . De indicatie geldt alleen in gevallen waarin behandeling met een ander antimicrobieel middel heeft gefaald.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair injectie bij varkens en subcutaan injectie bij runderen.
Goed schudden voor gebruik
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJD

Varkens: (Orgaan) vlees: 5 dagen

Runderen: (Orgaan) vlees : 8 dagen.
Melk: nul dagen.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Penicillines en cefalosporinen kunnen soms ernstige allergische reacties veroorzaken.
Lees de bijsluiter voor gebruik. Vermijd voor accidentele zelfinjectie.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: einde MM/JJ

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 25 ° C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren
Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – UDD - Op diergeneeskundig voorschrift

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Laboratorios Calier, S.A.
Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Spanje

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

NL: REG NL 106259

BE: BE-V367035

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Partij