

ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Торба от 25 kg

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

НЕО ОКСИВЕТ ПРЕМИКС
NEO OXYVET PREMIX

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

1 kg НЕО ОКСИВЕТ ПРЕМИКС съдържа:

Активна субстанция:

44 g Oxytetracycline HCL (еквивалентен на 40,8 г Oxytetracycline base)

44 g Neomycin sulfate (еквивалентен на 30,8 г Neomycin base)

Експципиент:

Пшенично брашно

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Медикаментозен премикс.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

25 kg

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Свине и птици.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

НЕО ОКСИВЕТ ПРЕМИКС се прилага за лечение на широк спектър бактериални инфекции, причинени от чувствителни към окситетрациклин и неомидин микроорганизми.

Птици: за лечение на колибацилоза, салмонелоза и други бактериални ентерити.

Свине: за лечение на колибацилоза, салмонелоза, дизентерия и други инфекции на гастроинтестиналния тракт.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Окситетрациклинът и неомидина при свине и птици се прилагат основно перорално в дози от 10-20 mg/kg телесна маса, според характера и тежестта на заболяването.

Точната доза НЕО ОКСИВЕТ ПРЕМИКС трябва да се изчисли според телесната маса и дневната консумация на храна.

Препоръчителната доза на смесване (10 mg/kg телесна маса) е 5 kg НЕО ОКСИВЕТ ПРЕМИКС на t фураж (220 g окситетрациклин и 220 g неомизин сулфат на t фураж).
Консултирайте се с ветеринарен лекар, в случай, че симптомите на заболяването продължават да се проявяват след 2 - 3 дни от началото на лечението.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Свине, месо и вътрешни органи: 6 дни.

Птици, месо и вътрешни органи: 14 дни.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След първо отваряне, използвай в рамките на 3 месеца.

След размесване, използвай в рамките на 1 месец.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо място.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

PROVET S.A.
Eleftherias Avenue 120, Eleousa Zitsa Ioannina, 45500
Greece

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП
--

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

ЛИСТОВКА:

НЕО ОКСИВЕТ ПРЕМИКС
Свине и птици

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

PROVET S.A.
Eleftherias Avenue 120, Eleousa Zitsa Ioannina, 45500
Greece

Производител, отговорен за освобождаване на партидата

PROVET S. A.
19 300 Aspropyrgos, Attiki
Greece

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

НЕО ОКСИВЕТ ПРЕМИКС
NEO OXYVET PREMIX

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТА

1 kg НЕО ОКСИВЕТ ПРЕМИКС съдържа:

Активна субстанция:

44g Oxytetracycline hydrochloride (еквивалентен на 40,8 g Oxytetracycline base)

44 g Neomycin sulfate (еквивалентен на 30,8 g Neomycin base)

Експципиент:

Пшенично брашно.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

НЕО ОКСИВЕТ ПРЕМИКС се прилага за лечение на широк спектър бактериални инфекции, причинени от чувствителни към окситетрациклин и неомицин микроорганизми.

Птици: за лечение на колибацилоза, салмонелоза и други бактериални ентерити.

Свине: за лечение на колибацилоза, салмонелоза, дизентерия и други инфекции на гастроинтестиналния тракт.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Употребата на тетрациклини по време на растежа на зъбите може да доведе до промяна в цвета им.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в този етикет или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Свине и птици.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Окситетрациклинът и неомицинът при свине и птици се прилагат основно перорално в дози от 10-20 mg/kg телесна маса, според характера и тежестта на заболяването.

Точната доза НЕО ОКСИВЕТ ПРЕМИКС трябва да се изчисли според телесната маса и дневната консумация на храна.

Препоръчителната доза на смесване (10 mg/kg телесна маса) е 5 kg НЕО ОКСИВЕТ ПРЕМИКС на t фураж (220 g окситетрациклин и 220 g неомицин сулфат на t фураж).

Консултирайте се с ветеринарен лекар, в случай, че симптомите на заболяването продължават да се проявяват след 2 - 3 дни от началото на лечението.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Няма.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Свине, месо и вътрешни органи: 6 дни.

Птици, месо и вътрешни органи: 14 дни.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 3 месеца.

Срок на годност след размесване с храната фуража: 1 месец.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към тетрациклини и аминогликозиди трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици и маска, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

След употреба измийте добре ръцете.

Бременност:

Прилагането на тетрациклини по време на зъбното развитие, включително в напреднала бременност, може да доведе до промяна в цвета им.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Съдържание на калций над 1 % във фуража намалява ефективността на окситетрациклин, поради образуване на хелатни съединения с йоните на калция и магнезия.

Основни несъвместимости:

Тетрациклините не трябва да се прилагат едновременно с пеницилини, цефалоспорини и тилозин.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

02/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Торба от 25 kg.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Възраждане-Касис ООД

бул. България 102-4, Ловеч 5500

Тел: + 359 68 604 111

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР