

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/05/1523

Vitamin E + Selen vet šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un aitām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk
Beļģija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vitamin E + Selen vet šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un aitām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

E vitamīns (α -tokoferola acetāta veidā) 100 mg
Selēns (1,315 mg bezūdens nātrija selenīta veidā) 0,6 mg

Palīgvielas:

Benzilspirts, nātrija laurilsulfāts, nātrija metilparahidroksibenzoāts, makrogolģlicerīna ricinoleāts, dietilēnglikola monoetilēteris, ūdens injekcijām.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Vitamīna E un selēna nepietiekamības novēršanai un ārstēšanai. Miopātijas/dispnojas (baltmuskuļu slimība) sindroms liellopiem (teļiem), muskuļu deģenerācija cūkām un aitām.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ievērojot ieteikto devu, lietošanas veidu un īpašos norādījumus lietošanai, vietējas vai vispārējas reakcijas netiek novērotas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (teļi), cūkas, aitas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES

Intramuskulārai lietošanai.

Miopātijas novēršanai

Liellopi (teļi), aitas, cūkas: 1 ml zāļu uz 10 kg ķermeņa svara. Ja vajadzīgs, pēc 15 dienām zāļu lietošanu var atkārtot, ievadot 0,5 ml zāļu uz 10 kg ķermeņa svara.

Deficīta sindromu ārstēšanai

Liellopi (teļi), aitas, cūkas: 1 ml zāļu uz 5 kg ķermeņa svara. Ja vajadzīgs, pēc 15 dienām zāļu lietošanu var atkārtot, ievadot 0,5 ml zāļu uz 5 kg ķermeņa svara.

Izmantojiet sterilu aprīkojumu un pirms injekcijas veiciet lokālu apvidus dezinfekciju.

Vienā injekcijas vietā neievadīt vairāk kā 15 ml.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Sk. 8. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes".

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 14 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nelietot pieaugušiem liellopiem vakcinācijas laikā.

Grūsnība un laktācija:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības laikā.

Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārdozēšanas gadījumā pirmās pazīmes rada selēna izraisīta toksikoze, un tās ir saistītas ar centrālo nervu sistēmu (redzes zudums, līdzsvara traucējumi). Vēlākā fāzē rodas apnoja. Šādā gadījumā nepieciešama tūlītēja simptomātiska ārstēšana.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

01/2021

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.