

PAKKAUSSELOSTE

Benzylpenicillin Vetcare 600 mg intrammaarisuspensio lypsäälle lehmälle.

**1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN
VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE
EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI**

Myyntiluvan haltija: Vetcare Ltd, PL 99, 24101 Salo, Suomi
Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja: aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden, Saksa

2. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Benzylpenicillin Vetcare 600 mg intrammaarisuspensio lypsäälle lehmälle.

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Jokainen esityytetty 10 g ruisku sisältää:

Vaikuttava aine: Bentsyylipenisilliiniprokaiini 600 mg (600 000 IU).

Muut aineet: Mettyliparahydroksibentsoaatti (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaatti (E216)

4. KÄYTTÖAIHEET

Benzylpenicillin Vetcare valmistetta käytetään penisilliinille herkkien bakteerien aiheuttaman utaretulehduksen hoitoon lypsykaudella. Kudokseen tunkeutuvien baktereiden, kuten *S. aureus*, aiheuttaman kliinisen utaretulehduksen hoito yhdessä muun penisilliinhoidon kanssa.

5. VASTA-AIHEET

Benzylpenicillin Vetcare valmistetta ei tule käyttää eläimille, joilla on penisilliini- tai prokaiimiiliherkkyyys.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Jos eläin on yliherkkä penisilliinille tai prokaiinille, yliherkkyyssreaktion oireena voi esiintyä esim. turvotusta, ilo-oireita ja jopa shokki.

Jos havaitset vakavia vaiktuksia tai joitakin muita sellaisia vaiktuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi

7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Nauta (lypsylehmä).

8. ANNOTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Utareen sisäiseen käyttöön.

Yksi ruiskullinen (10 g) tyhjäksi lypsettyyn utareneljännekseen kerran päivässä 3-5 päivän ajan. Jotta kudoksessa saavutetaisiin riittävä penisilliinipitoisuus, on suositeltavaa annostella penisilliiniä myös lihaksensisäisesti silloin, kun hoidetaan kudokseen tunkeutuvien baktereiden (esim. *S. aureus*) aiheuttamaa utaretulehdusta.

9. ANNOTUSOHJEET

Puhdista vetimen pää huolellisesti ennen valmisten antamista. Poista ruiskun kärkisuojus ja ruiskuta lääke vetimen sisään. Ruiskussa on kaksoiskärki. Normaalitapauksessa suositellaan, että ainoastaan uloin korkki poistetaan, jolloin paljastuu noin 5 mm pitkä ruiskun kärki. Käytettäessä lyhyttä kärkeä voidaan vähentää vedinkanavan mekaanista ärsytystä läkettä annettaessa. Jos myös sisempi korkki poistetaan, paljastuu noin 20 mm pitkä kärki, jota voidaan käyttää helpottamaan annostelua esimeriksi voimakkaasti pöhötyneeseen vetimeen. Annostelun jälkeen utareneljännestä hierotaan, jotta lääke levääisi tasaisesti. Neljännes voidaan lypsää kahden tunnin välein.

10. VAROAIKA

Maito: 6 vrk.

Teurastus: 3 vrk.

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C.

Ei saa käyttää pakaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

12. ERITYISVAROITUKSET

Benzylpenicillin Vetcare valmisten teho heikkenee, jos sen kanssa käytetään yhtä aikaa eräitä muita antibiootteja, esimerkiksi tetrasykliiniä tai spiramysiiniä.

Valmisten epääsianmukainen käyttö voi lisätä penisilliinille vastustuskykyisten bakteerien määrää.

Valmistetta käytettäessä on otettava huomioon viralliset ja paikalliset mikrobilääkkeiden käyttöä koskevat suosituksset. Joillakin alueilla tai joissakin karjoissa *S. aureus* penisilliiniresistenssi voi olla yleistä.

Ohjeet lääkkeen antajalle:

Pese kädet lääkkeen annon jälkeen. Penisillineille, muille beettalaktaamiantibiooteille tai prokaiinille yliherkkien ihmisten on varottava ihokontaktia lääkkeen kanssa. Bentsyylipenisilliini saattaa aiheuttaa yliherkkyyssreaktioita ihokosketuksissa ja syötynä. Näitä ovat ihottumat, kurkunpää-, huulien- tai kasvojen turvotukset ja hengitysvaikeudet. Ota yhteyttä lääkäriin, jos saat mainittuja oireita lääkettä käsitellessäsi.

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Ympäristö- ja turvallisuussyyistä käytämätön valmiste on toimitettava hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

30.6.2023

15. MUUT TIEDOT

Pakauskoot: 3 x 10 g, jossa 3 kpl puhdistuspyyhkeitä
 5 x 10 g, jossa 5 kpl puhdistuspyyhkeitä
 100 x 10 g, jossa 100 kpl puhdistuspyyhkeitä

Kaikkia pakauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta:

Vetcare Ltd, PL 99, 24101 Salo

BIPACKSEDEL

Benzylpenicillin Vetcare 600 mg intramammär suspension till lakterande ko

- 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLika**

Innehavare av godkännande för försäljning:

Vetcare Ltd, PO Box 99, 24101 Salo, Finland

Tillverkare:

aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Tyskland

- 2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELETS NAMN**

Benzylpenicillin Vetcare 600 mg intramammär suspension till lakterande ko

- 3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER**

En förfylld spruta à 10 g innehåller:

Aktivt innehållsämne: Bensylpenicillinprokain 600 mg (600 000 IU).

Övriga innehållsämnen: Methylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216)

- 4. INDIKATION(ER)**

Benzylpenicillin Vetcare används för behandling av mastit (juverinflammation) hos lakterande kor förorsakad av penicillinkänsliga bakterier. Som komplement till allmänbehandling med penicillin vid klinisk mastit

orsakad av bakterier som invaderar juvervävnaden, såsom t.ex. *S. aureus*.

- 5. KONTRAINDIKATIONER**

Benzylpenicillin Vetcare ska inte användas vid överkänslighet mot penicillin eller prokain.

- 6. BIVERKNINGAR**

Vid överkänslighet mot penicillin eller prokain kan biverkningar som ödem, hudförändringar och anafylaktisk chock förekomma.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Nöt (lakterande kor).

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För intramammär användning.

En spruta à 10 g per juverfjärdedel dagligen efter urmjölkning i 3-5 dagar. För att uppnå högre läkemedelskoncentration i vävnaden rekommenderas samtidig parenteral administration speciellt vid fall orsakade av invasiva bakteriearter, t.ex. *S. aureus*.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Rengör spenspetsen noggrant före användning. Ta av hylsan på sprutans spets och töm sprutans innehåll i spenkanalen. Sprutan har en dubbel spets. I vanliga fall rekommenderas att endast ta av den yttersta hylsan, då får man en ca. 5 mm lång spets. Genom att använda den korta spetsen minskas den mekaniska irritationen av spenkanalen, när läkemedlet administreras. Om även den inre hylsan avlägsnas får man en ca. 20 mm lång spets. Denna kan användas för att underlätta administrering, t.ex. i en svullen spene. Massera juverdelen efter administrering för att fördela läkemedlet jämnt. Juverdelen kan mjölkas ur varannan timme.

10. KARENSTID

Mjölk: 6 dygn. Slakt: 3 dygn.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Effekten av Benzylpenicillin Vetcare minskar om man samtidigt använder vissa andra antibiotika t.ex. tetracyklin eller spiramycin.

Oriktig användning av läkemedlet kan öka förekomsten av bakterier som är motståndskraftiga mot penicillin. Användning av läkemedlet skall ske i överensstämmelse med nationella behandlingsrekommendationer. I vissa geografiska områden eller i vissa individuella besättningar är resistensen mot penicillin hos *S. aureus* utbredd.

Särs kilda försiktighets åtgärder för personer som administrerar läkemedlet

Tvätta händerna efter användning av läkemedlet. Personer, som är överkänsliga mot penicillin, andra betalaktam-antibiotika eller prokain, bör undvika beröring med läkemedlet. Bensylpenicillin kan förorsaka överkänslighetsreaktioner vid hudkontakt och intag. Utslag, svullnad i svalget, läppar och ansikte samt andnöd kan förekomma. Uppsök läkare om du upplever dessa symptom vid hantering av läkemedlet.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDÉ FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

30.6.2023

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlek: 3 x 10 g med 3 rengöringsdukar
 5 x 10 g med 5 rengöringsdukar
 100 x 10 g med 100 rengöringsdukar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Ytterligare upplysningar om Benzylpenicillin Vetcare kan erhållas hos den ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Vetcare Ltd PB 99 24101 Salo