

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR**Caja con 1 vial de 50 ml, 100 ml, 250 ml y 1 litro****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

PARAMECTIN 10 mg/ml solución inyectable para bovino y porcino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Principio activo:

Ivermectina 10 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

1 Litro

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacuno de carne y vacas lecheras en periodo de secado) y porcino.

5. INDICACIONES DE USO**6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía subcutánea.

Para administración en dosis única.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para garantizar una dosificación correcta.

Bovino:

El medicamento veterinario debe ser administrado únicamente por vía subcutánea a la dosis recomendada de 1 ml por cada 50 kg de peso vivo.

Por ejemplo:

Peso vivo (kg)	Volumen Dosis (ml)	Dosis por Envase				
		50 ml	100 ml	250 ml	500 ml	1 litro
Hasta 50	1	50	100	250	500	1000
51 - 100	2	25	50	125	250	500
101 - 150	3	16	33	83	166	333
151 - 200	4	12	25	62	125	250

201 - 250	5	10	20	50	100	200
251 - 300	6	8	16	41	83	166

Por encima de 300 kg de peso vivo, administrar 1 ml por cada 50 kg de peso vivo.

Porcino:

El medicamento veterinario debe administrarse únicamente por vía subcutánea en el cuello a la dosis recomendada de 1 ml por cada 33 kg de peso vivo. Se recomienda la utilización de una aguja estéril de calibre 17 y 0,5 pulgada de longitud. Es importante la administración de la dosis exacta, especialmente en cerdos de bajo peso, por tanto debe utilizarse una jeringa capaz de dosificar en intervalos de 0,1 ml.

La siguiente tabla indica los volúmenes de dosis recomendados en función del peso, y el número de dosis por envase. En cerdos, especialmente aquellos con un peso inferior a 16 kg de peso vivo, para los que se administran volúmenes inferiores a 0,5 ml del medicamento veterinario, es importante la exactitud en la dosificación. Para lechones de pesos inferiores a 16 kg de peso vivo, administrar 0,1 ml/3kg de peso vivo.

Peso vivo (kg)	Volumen Dosis (ml)	Dosis por Envase				
		50 ml	100 ml	250 ml	500 ml	1 litro
16	0,5	100	200	500	1000	2000
33	1,0	50	100	250	500	1000
50	1,5	33	66	166	333	666
66	2,0	25	50	125	250	500
99	3,0	16	32	83	166	333
133	4,0	12	24	62	125	250
166	5,0	10	20	50	100	200
200	6,0	8	16	41	83	166

Por encima de 200 kg de peso vivo, administrar 1,0 ml por cada 33 kg de peso vivo.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino

Carne: 49 días.

Su uso no está autorizado en vacas en lactación cuya leche se utiliza para el consumo humano. No utilizar en vacas lecheras en periodo de secado, incluyendo novillas gestantes en los 60 días previos al parto.

Porcino

Carne: 18 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

Proteger de la luz directa del sol.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1442 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**ETIQUETA vial de 50 ml, 100 ml, 250 ml y 1 litro****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

PARAMECTIN 10 mg/ml solución inyectable para bovino y porcino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Principio activo:

Ivermectina 10 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacuno de carne y vacas lecheras en periodo de secado) y porcino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**Solución inyectable**

Vía subcutánea

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Carne: 49 días.

Su uso no está autorizado en vacas en lactación cuya leche se utiliza para el consumo humano.
No utilizar en vacas lecheras en periodo de secado, incluyendo novillas gestantes en los 60 días previos al parto.**Porcino**

Carne: 18 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C.
Proteger de la luz directa del sol.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}