

Engemycin Vet. injektionsvæske, opløsning 100 mg/ml

Atļautas

- Oxytetracycline hydrochloride
- Oxytetracycline hydrochloride

Zāļu identifikācija

Zāļu nosaukums:

Engemycin Vet. injektionsvæske, opløsning 100 mg/ml

Aktīvā viela:

Pieejamas tikai [English](#)

Pieejamas tikai [English](#)

Mērķsugas:

Aita

Liellops

Cūka

Lietošanas veids:

intramuskulārai lietošanai

intravenozai lietošanai

Sīkāka informācija par zālēm

Aktīvā viela un stiprums:

Pieejamas tikai [English](#)

113.00 miligrams(i) / 1.00 mililitrs(i)

Pieejamas tikai English

113.00 miligrams(i) / 1.00 mililitrs(i)

Farmaceutiskā forma:

Šķīdums injekcijām

Ierobežojumu periods pēc lietošanas veida:

intramuskulārai lietošanai:

•

Aita

- Gaļa un blakusprodukti. 30 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- Gaļa un blakusprodukti. 30 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

•

Liellops

- Gaļa un blakusprodukti. 30 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- Gaļa un blakusprodukti. 30 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

•

Cūka

- Gaļa un blakusprodukti. 30 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- Gaļa un blakusprodukti. 30 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

intravenozai lietošanai:

•

Liellops

- Gaļa un blakusprodukti. 6 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- Gaļa un blakusprodukti. 6 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

•

Cūka

- Gaļa un blakusprodukti. 6 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- Gaļa un blakusprodukti. 6 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

•

Aita

- Gaļa un blakusprodukti. 6 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

- Gaļa un blakusprodukti. 6 diena

Må ikke anvendes for at opnå forlænget effekt (høj dosis) hos lakterende dyr, der producerer mælk til konsum.

Anatomiski terapeitiski ķīmiskais veterinārais (ATĶvet) kods:

QJ01AA06

Izplatīšanas juridiskie nosacījumi:

Recepšu veterinārās zāles

Atļaujas statuss:

Derīga

Atļautas:

Pieejamas tikai [Spanish](#) [Czech](#) [German](#) [Estonian](#) [English](#) [French](#) [Italian](#) [Dutch](#) [Portuguese](#) [Slovak](#) [Swedish](#) [Icelandic](#) [Norwegian](#)

Pieejams:

Denmark

Iepakojuma apraksts:

Pieejamas tikai [Danish](#)

Pieejamas tikai [Danish](#)

Papildu informācija

Tiesību tips:

Marketing Authorisation

Veterināro zāļu atļaujas piešķiršanas juridiskais pamats:

Tiesiskais pamatojums, uz kuru neattiecas Direktīva 2001/82/EC

Tirdzniecības atļaujas turētājs:

Intervet International B.V.

Tirdzniecības atļaujas datums:

7/02/1983

Ražošanas vietas sēriju izlaidei:

Intervet International GmbH

Intervet Productions S.r.l.

Atbildīgā iestāde:

Danish Medicines Agency

Atļaujas numurs:09743

Atļaujas statusa maiņas datums:7/02/1983

Lai uzzinātu par veterināro zāļu blakusparādībām, lūdzu, dodieties uz:
www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Zāļu apraksts

Šis dokuments neeksistē šādā valodā(latviešu). Jūs to varat atrast citā valodā zemāk.