

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 1 vial de 10 ml

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

IMALGENE 100 mg/ml solución inyectable  
Hidrocloruro de ketamina

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Cada ml contiene:

**Sustancia activa:**

Ketamina (hidrocloruro) ..... 100 mg

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

10 ml

### 5. ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos.

### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

### 7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vías de administración: intravenosa o intramuscular.

Dosificación estándar recomendada (cuando se usa sola, sin premedicación):

Vía intravenosa:

Administrar 5-8 mg de ketamina/kg (equivalente a 0,05 – 0,08 ml de medicamento/kg).

Vía intramuscular:

Administrar 15-20 mg de ketamina/kg (es decir 0,15 – 0,2 ml de medicamento/kg).

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-07

Las respuestas individuales pueden variar. La dosificación recomendada depende por lo tanto de la profundidad de la anestesia que se desee obtener, de la vía de administración y de los demás fármacos administrados de forma conjunta. Los intervalos dados son orientativos.

Cuando se usa con premedicación y/o en uso conjunto con otros fármacos anestésicos, las dosis a administrar son inferiores. La premedicación debe administrarse 15-20 minutos antes de la inducción.

Si es necesario, la anestesia puede prolongarse con dosis de mantenimiento.

Posología de mantenimiento de acuerdo con la necesidad:

- 1ª inyección:  $\frac{1}{2}$  de la dosis inicial
- inyecciones posteriores:  $\frac{1}{4}$  de la dosis inicial

No obstante la dosis real se basará en la respuesta individual del paciente.

Lea el prospecto antes de usar.

## **8. TIEMPO DE ESPERA**

No procede.

## **9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)**

Es importante que tanto la inducción como la recuperación tengan lugar en un entorno tranquilo y en calma.

De forma general, se considera una buena práctica anestésica mantener a los animales en ayunas durante 12 horas, aproximadamente, antes de ser sometidos a una anestesia general.

## **10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {mes/año}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

## **11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

## **12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Eliminar los residuos de conformidad con las normativas locales.

## **13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**



Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  
Administración exclusiva por el veterinario.

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U  
C/Prat de la Riba, 50  
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
España

**16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2529 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote {número}



**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

Vial de 10 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

IMALGENE 100 mg/ml solución inyectable  
Hidrocloruro de ketamina

**2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Cada ml contiene:

Ketamina (hidrocloruro) ..... 100 mg

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**

10 ml

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Intravenosa o intramuscular.

**5. TIEMPO DE ESPERA**

No procede.

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lote

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {mes/año}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

**8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.