

Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Apocillin filmdrasjerte tabletter 165 mg

Apocillin filmdrasjerte tabletter 330 mg

Apocillin filmdrasjerte tabletter 660 mg

Apocillin filmdrasjerte tabletter 1 g

fenoksymetylpenicillinkalium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Apocillin er, og hva det brukes mot.
2. Hva du må vite før du bruker Apocillin.
3. Hvordan du bruker Apocillin.
4. Mulige bivirkninger.
5. Hvordan du oppbevarer Apocillin.
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon.

1. Hva Apocillin er, og hva det brukes mot

Apocillin er et antibiotikum. Det inneholder et penicillin som har det kjemiske navnet fenoksymetylpenicillinkalium. Penicillin dreper en rekke bakterier.

Apocillin brukes ved infeksjoner forårsaket av bakterier. Eksempler på infeksjonssykdommer der preparatet benyttes: Infeksjoner i hals, øre, bihuler, bronkier og lunger. Ved sår og hudinfeksjoner brukes preparatet ofte sammen med en bakteriedrepende krem, salve eller lignende. Apocillin har ingen effekt på virus, f.eks. vanlig forkjølelse og influensa.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Apocillin

Bruk ikke Apocillin

- hvis du er allergisk overfor fenoksymetylpenicillinkalium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
- dersom du reagerer allergisk på penicillin eller har hatt reaksjon på cefalosporiner.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Apocillin.

Vis forsiktighet ved bruk av Apocillin dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Andre legemidler og Apocillin

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Penicilliner kan øke effekten av metotreksat. Samtidig bruk av legemidler som øker urinsyreutskillelsen (for eksempel probenelid) kan øke effekten av penicilliner. Guar gummi (polysakkarici) og andre antibakterielle legemidler kan redusere effekten av penicilliner. Bruk av penicilliner sammen med antikoagulanter (legemidler som nedsetter blodets evne til å levre) kan øke tiden det tar for blodet å levre seg.

Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Ingen uheldige effekter på fosteret er vist.

Går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at det har noen virkning på barn som ammes. Snakk likevel med lege ved bruk av Apocillin under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Apocillin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Apocillin inneholder kalium

Apocillin 660 mg inneholder 1,7 mmol (66 mg) kalium per tablett og Apocillin 1 g inneholder 2,6 mmol (100 mg) kalium per tablett. Dette må tas med i betraktning for pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller pasienter som går på en kontrollert kaliumdiett.

Apocillin inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Apocillin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Vanligvis anbefales det å ta 1 tablett 4 ganger i døgnet. Tidspunktene for når du tar tablettene bør fordeles jevnt utover den våkne tiden av døgnet.

Tablettene bør svelges hele, men om nødvendig så kan de deles. Tablettene kan tas både med mat eller uten mat.

Fullfør alltid kuren slik legen har bestemt selv om du føler deg bedre. Infeksjonen kan blusse opp igjen hvis du avslutter kuren for tidlig.

Dersom du tar for mye av Apocillin

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Dersom du har glemt å ta Apocillin

Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandling med Apocillin

Fullfør kuren, selv om du føler deg bedre. Faren ved å avslutte behandlingen for tidlig, er at infeksjonen kan blusse opp igjen. Hvis du synes legemidlet ikke har virket i løpet av 2-3 døgn, bør du kontakte legen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan Apocillin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Bivirkninger ved bruk av penicilliner er vanligvis ufarlige. Mest vanlig er mage-tarmbesvær i form av kvalme og diaré. Allergiske reaksjoner med f.eks. hudutslett, eventuelt med kløe og utslett (elveblest, hevelser i huden) kan forekomme. Ta med en gang kontakt med lege dersom du får kløe eller hevelse i huden.

Hudreaksjoner uten kløe behøver *ikke* bety at penicillin må unngås senere. Husk likevel å nevne slike reaksjoner for legen neste gang det er aktuelt å bruke medisin mot infeksjoner.

I meget sjeldne tilfeller kan blodets røde og hvite blodlegemer bli påvirket. Andre bivirkninger som opptrer svært sjeldent er oppkast, halsbrann, betennelse i tykktarm, munn og på tunge, utslett (erytema multiforma), kløe rundt endetarmsåpningen, hudbetennelse, nyresykdom, feber, opphovning av ansikt og hals, leddsmerte, svekket berøringssans og sykdom i hjernen.

Bruk av Apocillin over lang tid kan føre til soppinfeksjon i ytre kjønnsorgan og skjede (vulva vaginitt).

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via nettside www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Apocillin

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Apocillin etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Apocillin

- Virkestoff er fenoksymetylpenicillinkalium.
- Hjelpetoffer er povidon (E1201), krysskarmellosenatrium (E466), talkum (E553b), magnesiumstearat (E470b), hypromellose (E464), makrogol og farge: titandioksyd (E171).

Apocillin finnes også som dråper og mikstur.

Hvordan Apocillin ser ut og innholdet i pakningen

Tablettene er hvite, kapselformede og kan deles. APO 165, APO 330, APO 660 eller APO 1000 er preget på tablettene.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Actavis Group PTC ehf.

~~Reykjavíkurvegur 76-78, Dalshraun 1~~
220 Hafnarfjörður
Island

Tilvirker
Sandoz GmbH,
Biochemiestrasse 10,
6250 Kundl,
Østerrike.

For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert ~~20.11.2020~~ [07.06.2023](#)

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.