

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Panacur Pet Pasta 187,5 mg/g perorální pasta pro psy a kočky

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Kórverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

27460 Igoville

Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panacur Pet Pasta 187,5 mg/g perorální pasta pro psy a kočky

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g perorální pasty obsahuje:

Léčivá látka:

Fenbendazolum 187,5 mg

Pomocné látky:

Methylparaben (E 218) 1,7 mg

Propylparaben (E 216) 0,16 mg

Bílá až nažedlá, jemná, roztíratelná, homogenní pasta.

4. INDIKACE

Léčba infestací gastrointestinálními hlísticemi u koťat a dospělých koček a štěňat a dospělých psů. U psů také jako prostředek k tlumení protozoální infekce giardiózy.

Koťata a dospělé kočky:

Infestace následujícími gastrointestinálními nematody:

Toxocara cati (dospělci)

Ancylostoma tubaeforme (vývojová stádia a dospělci)

Štěňata a dospělí psi:

Infestace následujícími gastrointestinálními parazity:

Toxocara canis (dospělci),

Ancylostoma caninum (dospělci),

Uncinaria stenocephala (vývojová stádia a dospělci) a

Giardia spp.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u březích fen až do 39. dne březosti.

Nepoužívejte u březích koček.

Čtete také bod 12 „Zvláštní upozornění“.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Léčená zvířata mohou výjimečně zvracet nebo se u nich může vyvinout ve spojení s odčervením mírný průjem.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Každý injektor obsahuje 4,8 g pasty, odpovídá 900 mg fenbendazolu. Pro přípravu injektoru Panacur Pet Paste k prvnímu použití odstraňte špičku injektoru a otáčejte kroužek číselníku, dokud hrana kroužku nejbližší ke špičce není v jedné linii se značkou 0 na tubě. Stlaďte píst a odstraňte přebytečnou pastu. Injektor je připraven k použití. Píst má 18 dílků, každá jednotka odpovídá 50 mg fenbendazolu. Podle živé hmotnosti zvířete stanovte počet potřebných jednotek. Otáčením nastavte kroužek na pístu na odpovídající počet jednotek.

Jeden injektor Panacur Pet Pasta je určen k použití u zvířat o živé hmotnosti do 6 kg. Pokud živá hmotnost zvířete přesahuje 6 kg, je třeba použít více než jeden injektor.

Dospělé kočky

Dávka je 75 mg fenbendazolu/kg živé hmotnosti/den po 2 po sobě následující dny.

Denní dávka na 2 kg živé hmotnosti odpovídá 3 dílkům na pístu. Výsledné dávkovací schéma je následující:

do 2 kg ž.hm.	3 dílky na injektoru denně po 2 dny
2,1 až 4 kg ž.hm.	6 dílků na injektoru denně po 2 dny
4,1 až 6 kg ž.hm.	9 dílků na injektoru denně po 2 dny
atd.	

K výpočtu požadované dávky stanovte živou hmotnost léčeného zvířete co nejpřesněji.

Koťata, štěňata a dospělí psi

Dávka je 50 mg fenbendazolu/kg živé hmotnosti/den po 3 po sobě následující dny.

Dávkovací schéma je následující:

1,0 až 2 kg ž.hm.	2 dílky na injektoru denně po 3 dny
2,1 až 3 kg ž.hm.	3 dílky na injektoru denně po 3 dny
3,1 až 4 kg ž.hm.	4 dílky na injektoru denně po 3 dny

4,1 až 5 kg ž.hm. 5 dílků na injektoru denně po 3 dny
5,1 až 6 kg ž.hm. 6 dílků na injektoru denně po 3 dny
atd.

Eliminace *Ancylostoma tubaeforme* u dospělých koček, *Giardia* spp. u psů a škrkavek zejména u štěňat a koťat, zejména za podmínek silné expozice, může být u jednotlivých zvířat neúplná, a proto zůstává nebezpečí nakažení pro lidi přicházející do kontaktu s těmito zvířaty. Proto by se mělo provádět vyšetření trusu a na základě výsledků a vyhodnocení veterinárního lékaře v případě potřeby léčbu zopakovat.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Panacur Pet Pasta se podává přímo do dutiny ústní po krmení vytlačením pasty z injektoru na bázi jazyka.

Případně se pasta může zamíchat do krmení.

10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a na krabici po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Po častém a opakujícím se používání anthelmintik ze stejné skupiny se může vyvinout rezistence parazitů vůči kterékoliv látce z této skupiny anthelmintik.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Presnost dávkování je omezena, proto by se tento veterinární léčivý přípravek neměl používat u koťat s hmotností do 1 kg.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Vyhýbejte se co nejvíce přímému kontaktu přípravku s pokožkou.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo látky pomocné by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Březost a laktace:

Nepoužívejte u březích fen až do 39. dne březosti.

Panacur Pet Pasta může být použita k léčbě březích fen během posledního trimestru březosti. Ovšem vzhledem k tomu, že teratogenní účinek způsobený metabolitem fenbendazolu oxfendazolem nelze ve výjimečných případech úplně vyloučit, používejte pouze na základě zhodnocení poměru prospěchu a rizika odpovědným veterinárním lékařem.

Nepoužívejte u březích koček.

Přípravek lze používat u laktujících fen a koček.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U psů lze při podání trojnásobku doporučené dávky nebo při trojnásobně delším podávání, než je doporučená doba podávání, pozorovat přechodnou indukci lymfoidní hyperplazie žaludeční sliznice. Tato zjištění nemají žádný klinický význam.

Při stejném schématu předávkování nebyly u koček pozorovány žádné nežádoucí účinky spojené s podáváním přípravku.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2020

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: papírová krabička s 1 nebo 10 injektory

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.