

**ANNEXE III**  
**ÉTIQUETAGE ET NOTICE**

## **A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR /  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Etui carton 10 x 100 g****Sac en plastique de 1 kg et 5 kg (il n'y a pas d'emballage extérieur pour les 1 et 5 kg)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

VETOSPIRIN 1000 mg/g poudre pour administration dans l'eau de boisson/le lait pour les bovins et les porcins

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Salicylate de sodium 1000 mg/g

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

10 x 100 g

1 kg

5 kg

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins (veaux), porcins.

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie orale, à dissoudre dans l'eau de boisson ou le lait de remplacement.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Veaux, porcins :

Viande et abats : zéro jour.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

Après première ouverture, à utiliser dans les 3 mois.

Après reconstitution dans l'eau de boisson, à utiliser dans les 24 heures.

Après reconstitution dans le lait de remplacement, à utiliser dans les 6 heures.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans l'emballage d'origine.

Une fois ouvert, conserver à une température inférieure à 25 °C et garder le sac hermétiquement fermé afin de le protéger de la lumière et de l'humidité.

Ne pas utiliser dans l'eau de boisson à une température supérieure à 25 °C.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

V.M.D. n.v.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V543831 Sac (LDPE)

BE-V543822 Sac (PE)

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Sac en plastique de 100 g****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

VETOSPIRIN 1000 mg/g poudre pour administration dans l'eau de boisson/le lait pour les bovins et les porcins

100 g

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Salicylate de sodium 1 000 mg/g

**3. ESPÈCES CIBLES**

Bovins (veaux), porcins.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie orale, à dissoudre dans l'eau de boisson ou le lait de remplacement.  
Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :  
Veaux, porcins :  
Viande et abats : zéro jour.

**6. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

Après première ouverture, à utiliser dans les 3 mois. Après ouverture, utiliser avant ...Après reconstitution dans l'eau de boisson, à utiliser dans les 24 heures.  
Après reconstitution dans le lait de remplacement, à utiliser dans les 6 heures.

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

A conserver dans l'emballage d'origine.

Une fois ouvert, conserver à une température inférieure à 25 °C et garder le sac hermétiquement fermé afin de le protéger de la lumière et de l'humidité.

Ne pas utiliser dans l'eau de boisson à une température supérieure à 25 °C.

<b>8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ</b>
--

V.M.D. n.v.

<b>9. NUMÉRO DU LOT</b>
-------------------------

Lot {numéro}