MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

agencia española de medicamentos y productos sanitarios

PROSPECTO

NEUMOSUIN
Suspensión inyectable

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135.
17170 Amer (Girona) España.
Tel. (34) 972 43 06 60 - Fax (34) 972 43 06 61
E-mail: hipra@hipra.com

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

NEUMOSUIN
Suspensión inyectable.

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Por dosis (2 ml):

Sustancias activas:
Actinobacillus pleuropneumoniae inactivado, serotipo 2 ……..... ≥ 1/16 MAT *
Actinobacillus pleuropneumoniae inactivado, serotipo 4 ..... ≥ 1/16 MAT *
Actinobacillus pleuropneumoniae inactivado, serotipo 5 ..... ≥ 1/16 MAT *
*MAT: Título medio obtenido por el ensayo de microaglutinación en placa.

Adyuvantes:
Hidróxido de aluminio (Al^{+++}) ……..… 0,5315 mg

Conservante:
Metilparaben sódico …….. 2 mg
Propilparaben sódico ……...…... 0,4 mg

4. INDICACIÓN(ES) DE USO

Para la inmunización activa del ganado porcino para prevenir la infección causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae* responsable de la pleuroneumonía porcina.

5. CONTRAINDICACIONES

No procede.

6. REACCIONES ADVERSAS

Pueden producirse reacciones aisladas de hipersensibilidad en animales vacunados, en cuyo caso debe administrarse un antihistamínico.
En caso de inoculación defectuosa en tejido subcutáneo pueden aparecer reacciones locales que remiten a los pocos días.
Debido al adyuvante utilizado puede producirse en algunos animales reacciones locales en el punto de inoculación que desparecen a los pocos días.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

7. ESPECIES DE DESTINO

Porcino, (Cerdas gestantes, verracos, lechones destetados y cerdos de producción).

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Cerdos: 2 ml / cerdo a partir de las 6 semanas de edad, independientemente de su peso, edad y sexo.
El método de administración es por inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello, detrás de la base de la oreja.

Programa vacunal:
Cerdas gestantes: Vacunar a los 40-45 días antes del parto, revacunando 21 días después (20-25 días antes del parto). A partir de aquí, revacunar en cada posterior gestación, 1 mes aproximadamente antes del parto.
Verracos: Vacunación de todos los animales, revacunándolos a los 21 días. Revacunaciones posteriores cada 6 meses.
Lechones destetados: Vacunar a los 40-45 días de vida, revacunándolos a los 60-65 días de vida.
Cerdos de producción: Vacunación de todos los cerdos, al llegar a la explotación. Revacunar 3 semanas después.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

- Usar material estéril para su administración.
- Desinfectar el punto de inoculación.
- Agitar antes de usar.
- Administrar la vacuna cuando esté a temperatura de unos +15 a +25ºC.

10. TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.
Conservar y transportar refrigerado (entre 2º C y 8º C). No congelar. Proteger de la luz.
No usar después de la fecha de caducidad que figura en el envase.

12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Advertencias especiales para cada especie de destino
Vacunar únicamente animales sanos.

Precauciones especiales para su uso en animales
- Usar material estéril para su administración.
- Desinfectar el punto de inoculación.
- Agitar antes de usar.
- Administrar la vacuna cuando esté a temperatura de unos +15 a +25ºC.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales
En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el prospecto.

Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta
Puede administrarse en cualquier momento de la gestación o la lactancia.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
Ninguna conocida.

Sobredosificación
No provoca ninguna reacción adversa al administrar dos veces la dosis recomendada distinta a las indicadas en el punto 4.6.

Incompatibilidades
Ninguna conocida.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.
Pregunte a su veterinario cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Abril 2012

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Formatos:
- Caja con un vial de 10 dosis (20 ml).
- Caja con un vial de 50 dosis (100 ml).
- Caja con 12 viales de 50 dosis (100 ml).

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria
Administración bajo control o supervisión del veterinario

MINISTERIO
DE SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

Agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios