

ANGABEN AUF DEM UMKARTON**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Calcium gluconicum „Jacoby“ – Injektionslösung für Tiere

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

100 ml enthalten:

Calciumgluconat 38,00 g
Magnesiumchlorid 6,00 g

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 500 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Therapie von Hypocalcämie in Verbindung mit Magnesium-Mangelerscheinungen.

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Zur intravenösen Anwendung.

8. WARTEZEIT

Essbares Gewebe: 3 Tage

Milch: 1 Tag

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich – lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Erste Entnahme am ... um ... Uhr. Nach der ersten Entnahme im Kühlschrank (2°C - 8°C) aufbewahren. Der Inhalt darf nur innerhalb von 3 Tagen nach der ersten Entnahme verwendet werden. Nicht mehr als 10 Entnahmen zulässig.
Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere -
Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

JACOBY GM Pharma GmbH, Teichweg 2, 5400 Hallein

16. ZULASSUNGSSNUMMER(N)

15.252

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Calcium gluconicum, „Jacoby“ – Injektionslösung für Tiere

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

100 ml enthalten:

Calciumgluconat 38,00 g
Magnesiumchlorid 6,00 g

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

500 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Therapie von Hypocalcämie in Verbindung mit Magnesium-Mangelerscheinungen.

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Zur intravenösen Anwendung.

8. WARTEZEIT

Essbares Gewebe: 3 Tage

Milch: 1 Tag

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich – lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Erste Entnahme am ... um ... Uhr. Nach der ersten Entnahme im Kühlschrank (2°C - 8°C) aufbewahren. Der Inhalt darf nur innerhalb von 3 Tagen nach der ersten Entnahme verwendet werden. Nicht mehr als 10 Entnahmen zulässig.
Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere -
Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

JACOBY GM Pharma GmbH, Teichweg 2, 5400 Hallein

16. ZULASSUNGSNR.(N)

15.252

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.