

**B. NOTICE**

**NOTICE****PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE – VMD, Solution pour injection****1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des lots :  
V.M.D. s.a.

Hoge Mauw 900  
B-2370 Arendonk

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE – VMD, Solution pour injection  
Chlorhydrate de procaïne – Bitartrate d'épinéphrine

**3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**

Principe actif:

Chlorhydrate de procaïne 20 mg – Bitartrate d'épinéphrine 0,036 mg par ml.

Excipients: Chlorure de sodium

Métabisulfite de sodium

Édétate de sodium dihydraté

Méthyle parahydroxybenzoate de sodium

Eau pour injection.

**4. INDICATION(S)**

Cheval, bovin, porc, mouton, chien et chat :

Anesthésie locale lorsqu'un effet anesthésique de longue durée est souhaité (1 à 2 heures).

- Anesthésie locale.

- Anesthésie épидurale.

- Anesthésie de la conduction nerveuse.

**5. CONTRE-INDICATIONS**

- Ne pas utiliser pour l'anesthésie de régions à circulation terminale (oreilles, queue, pénis, etc.) en raison de la présence d'épinéphrine, substance possédant une action vasoconstrictrice (risque de nécrose tissulaire dû à un arrêt complet de la circulation sanguine).
- L'anesthésie épидurale n'est pas indiquée en cas d'administration de tranquillisants contenant de la phénothiazine (ces produits augmentent l'effet hypotenseur de la procaïne sur la pression artérielle).
- Ne pas utiliser pour une anesthésie avec du cyclopropane ou de l'halothane, étant donné que la sensibilité du cœur à l'adrénaline (sympathomimétique) en est augmentée (arythmies).
- Ne pas administrer à des animaux qui reçoivent un traitement avec des sulfamides.
- Ne pas administrer aux animaux présentant des problèmes cardiovasculaires.
- Ne pas administrer chez des animaux en état de choc.

**6. EFFETS INDÉSIRABLES**

- Dans certains cas, l'injection épidurale de l'anesthésique local ne donne pas une anesthésie suffisante chez les bovins. Les causes possibles peuvent être: trous intervertébraux non refermés, entraînant un écoulement de l'anesthésique dans la cavité péritonéale, dépôt de graisse important au niveau du site d'injection, empêchant la poursuite de la distribution de l'anesthésique local à travers l'espace épidual.
- La procaine peut provoquer de l'hypotension. Ce phénomène se manifeste plutôt chez l'anesthésie épidurale que chez l'anesthésie par infiltration.
- Dans quelques cas, une excitation du S.N.C. (agitation, tremblements, convulsions) est observée après l'injection de procaine, principalement chez le cheval.
- Des réactions allergiques à la procaine sont fréquentes; dans de rares cas, des réactions anaphylactiques ont été observées.
- Il existe une hypersensibilité croisée avec les anesthésiques locaux du type ester.
- Dans des cas exceptionnels, une tachycardie peut se produire (adrénaline).

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

## 7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Cheval, bovin, porc, mouton, chien et chat.

## 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Solution pour injection sous-cutanée, intramusculaire et épидurale.

1. Anesthésie locale ou anesthésie par infiltration: injection SC ou IM dans ou autour de la surface d'opération:

*Cheval, bovin, porc, mouton:* 100 - 400 mg (5 - 20 ml de PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE - VMD) par animal.

*Chien, chat:* 20 - 100 mg (1 - 5 ml de PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE - VMD) par animal.

2. Anesthésie épidurale: injection dans l'espace épidual.

Bovin:

*Anesthésie épidurale sacrée ou basse - opérations chirurgicales obstétriques simples:*

Veau: 200 mg (10 ml de PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE - VMD) par animal.

Jeune bovin: 240 mg (12 ml de PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE - VMD) par animal.

Vache: 300 mg (15 ml de PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE - VMD) par animal.

Mouton:

*Anesthésie épidurale sacrée ou basse*

60 - 100 mg (3 - 5 ml de PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE - VMD) par animal.

*Anesthésie épidurale haute*

Maximum 300 mg (15 ml de PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE - VMD) par animal.

Porc:

20 mg (1 ml de PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE - VMD) par 4,5 kg de poids corporel avec une dose maximale de 400 mg (20 ml).

Chien:

40 mg (2 ml de PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE - VMD) par 5 kg de poids corporel.

3. Anesthésie de la conduction nerveuse: injection à hauteur d'une branche nerveuse  
*Chien, chat: 40 - 100 mg (2 - 5 ml de PROCAINE HYDROCHLORIDE 2% + ADRENALINE - VMD) par animal.*

## **9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

- Ne pas injecter par voie intra-articulaire.
- Éviter l'injection par voie intraveineuse en aspirant d'abord avec le piston de la seringue.
- Les plaies ou les abcès suppurants ne peuvent pas ou peuvent difficilement être anesthésiés avec des anesthésiques locaux.
- Placer la tête de l'animal dans la bonne position en cas d'anesthésie épidurale.
- Pratiquer une anesthésie locale à température ambiante normale; en cas de température plus élevée, le risque de réactions toxiques est accru en raison de l'augmentation de la résorption de la procaïne.

## **10. TEMPS D'ATTENTE**

Viande et lait : 0 jours

## **11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C).

Protéger de la lumière.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur le flacon après EXP.

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 2 ans.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : utiliser immédiatement après ouverture.

## **12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

- Éviter un contact direct de la peau avec le liquide d'injection.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue au Chlorhydrate de procaïne devraient éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

- La procaïne passe la barrière placentaire. Après une parturition sous anesthésie épidurale, il faut en tenir compte chez l'animal nouveau-né.

- Interactions : La procaïne inhibe l'action des sulfamides en raison de sa biotransformation en acide para-aminobenzoïque, qui est un antagoniste des sulfamides. La procaïne prolonge l'action des myorelaxants. La procaïne potentialise l'action du procaïnamide. L'adrénaline potentialise l'action des anesthésiques halogénés sur le cœur.

- Surdosage : La solution est peu毒ique lorsqu'elle est injectée de manière appropriée.

En cas d'injection intravasculaire accidentelle, des symptômes toxiques apparaissent fréquemment. Les symptômes sont dus à une stimulation du S.N.C. (agitation, tremblements, convulsions), suivie d'une dépression, la mort étant la conséquence de la paralysie de la respiration. En cas de stimulation du S.N.C., des barbituriques à courte durée d'action sont administrés, de même que des produits destinés à acidifier les urines dans le but de favoriser l'excration rénale.

Des arythmies peuvent se produire à la suite d'une stimulation du myocarde (épinéphrine).

L'hypotension peut être la conséquence de l'apparition d'une vasodilatation (procaïne). En cas de réactions allergiques, des antihistaminiques ou des corticoïdes sont administrés. En cas de choc, le traitement est à base d'épinéphrine.

- La solution est incompatible avec des produits alcalins, l'acide tannique et des ions métalliques.

**13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

**14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE**

Janvier 2020

**15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Délivrance: Sur prescription vétérinaire.

BE-V104325