

ЛИСТОВКА :

BIO CHOLERA

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба :

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.
Via Vezza d'Oglio 3,
Milan 20139
Italy

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Boehringer Igelheim Animal Health Italia S.p.A
Via Baviera 9
35027 NOVENTA PADOVANA
Italy

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

BIO CHOLERA

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

СЪСТАВ НА 1 ДОЗА(0.5 ml):

Активна субстанция:

Pasteurella multocida, серотип А-1, А-3 и А-4, инактивирани, $\geq \log_2$ Elisa единици

Аджуванти:

Маслен аджувант, до 0.5ml

Експципиенти:

Тиомерсал, ≤ 0.050 mg

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Ваксината Bio cholera е показана за превантивна ваксинация при пилета и пуйки срещу холера по птиците. Най – вече ваксинацията се препоръчва в районите, където заболяването е разпространено. Най – добри резултати се получават, когато превантивната ваксинация е съпроводена с добра хигиена и в случай на избухване на заболяването, ваксинацията се съпровожда и с адекватно третиране с антибиотици. Препоръчват се 2 ваксинации през интервал от 4-6 седмици.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Може да се наблюдава краткотраен оток
вмястото на инжектирането, който се резорбира за по-малко от 2 седмици.
В редки случаи може да се наблюдава краткотрайна апатия и липса на апетит
(обикновено 12-24 часа след ваксинацията).

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Пилета и пуйки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

Препоръчват се 2 ваксинации през интервал от 4-6 седмици.

Дозата за всяка птица е 0.5 ml и трябва да се инжектира интрамускулно (в гръдния мускул) или подкожно (по-ниската дорзална част на шията). Реакции в мястото на инжектирането не се наблюдават, ако ваксината е приложена правилно, но може да се открият понякога следи от мазнина.

Ваксинационна програма:

-Подрастващи пилета (родители за бройлери и стокови носачки):

Първа ваксинация- на 3-4 седмична възраст;

Втора ваксинация- на 16-18 седмична възраст.

-Пуйки (родители за бройлери):

Първа ваксинация- на 5-6 седмична възраст;

Втора ваксинация- на 10-12 седмична възраст;

Трета ваксинация- на 24-26 седмична възраст.

-Пуйки бройлери

Първа ваксинация- на 5-6 седмична възраст;

Втора ваксинация- на 10-12 седмична възраст.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба ваксината трябва да се постави на стайна температура (+20 °C)

Трябва да сте сигурни, че ваксиналното оборудване е чисто и стерилно.

Да се разклати флаконът с ваксината преди употреба.

Да се избягва интравенозно инжектиране.

Да се ваксинират само здрави птици.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °C – 8 °C).

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Да се ваксинират само здрави птици.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

За потребителите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подуване, особено при инжектиране в става или пръст и в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако не е оказана навреме лекарска помощ.

Ако по случайност сте инжектирани с този ветеринарномедицински продукт, потърсете спешно съвет от лекар и носете листовката с Вас, дори да е инжектирано съвсем малко количество.

Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет от лекаря.

За лекарите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани малки количества, случайното инжектиране с този ветеринарномедицински продукт може да предизвика поява на силен оток. При инжектиране в пръста е възможно развитие на исхемична некроза и дори загуба на пръста. Необходима е незабавна, компетентна хирургическа намеса. Възможно е да се наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено, ако са засегнати пулпата на пръста или сухожилието.

Яйценосене:

Да не се използва при птици в период на яйценосене и в рамките на 4 седмици преди началото на яйценосния период.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, се препоръчва да не се използва друга ваксина 14 дни преди или след ваксинацията с Bio cholera.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При прилагане на доза 2 пъти по-голяма от препоръчаната не се наблюдавани неблагоприятни реакции.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти

**13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ
ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
12/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Д-Р ИВАН ШИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР