

I PIELIKUMS
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Animedazon 2,45% uz ādas lietojams aerosols, suspensija liellopiem, aitām un cūkām

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs aerosola flakons satur:

Aktīvā viela:

Hlortetraciklīna hidrohlorīds 3,210 g (atbilst 2,45 masas %)
(atbilst 2,983 g hlortetraciklīna)

Palīgvielas:

Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs	Kvantitatīvais sastāvs, ja šī informācija ir būtiska veterināro zāļu pareizai ievadīšanai
Patentzilais V 85% (E 131)	0,23 g
Izobutāns (propelents)	92,2 g
Izopropilspirts	
Sorbitāna trioleāts	
Silīcija dioksīds, koloidālais, bezūdens	

Vienmērīgi zilas krāsas aerosols.

3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

3.1. Mērķsugas

Liellopi, aitas, cūkas

3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Pret hlortetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu virspusēju traumatisku vai operācijas brūču infekciju ārstēšanai. Veterinārās zāles var lietot virspusēju ādas un nagu infekciju ārstēšanas, it sevišķi pret hlortetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisīta interdigitālā dermatīta (nagu puves, nagu bojājuma) un digitālā dermatīta gadījumā (Mortellaro slimība).

3.3. Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām.
Nelietot gadījumos, ja zināma rezistence pret tetraciklīniem.

3.4. Īpaši brīdinājumi

Nav.

3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Aizsargājiet dzīvnieka acis, izsmidzinot zāles galvas apvidū. Pirms izsmidzināšanas rūpīgi notīriet apstrādājamo zonu.

Šo veterināro zāļu lietošana jāpamato ar mērķa patogēna identificēšanu un jutības testa rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jābalsta uz vietēja rakstura (reģionālā/ novietnes līmenī) epidemioloģisko informāciju par mērķa patogēna jutību. Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Dzīvnieks nedrīkst laizīt ārstēto vietu sev vai citiem dzīvniekiem. Pēc veterināro zāļu izsmidzināšanas uz nagiem dzīvnieks vismaz stundu jātur uz sausas grīdas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Jāizvairās no tiešas saskares ar ādu sensibilizācijas, kontaktdermatīta un iespējamo hipersensitivitātes reakciju uz hlortetraciklīnu dēļ. Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, jāvalkā piemēroti šķidrumus necaurļaidīgi cimdi. Šīs veterinārās zāles var izraisīt nopietnu acu kairinājumu. Aizsargāt acis un seju. Ja notiek saskare ar ādu vai acīm, nekavējoties nomazgāt skarto vietu ar tīru, svaigu ūdeni. Ja kairinājums nepāriet, vajadzīga medicīniska palīdzība. Neieelpot tvaikus. Lietot veterinārās zāles ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Neēst vai nesmēķēt rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm. Pēc rīkošanās ar zālēm nomazgāt rokas.

Ja zāles tiek nejausi norītas, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojuma marķējumu ārstam.

Skat. Arī 5.3. apakšpunktu "Īpaši uzglabāšanas nosacījumi".

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Nav piemērojami.

Citi piesardzības pasākumi:

Iekrāsotā cūkādas daļa jāizgriež pirms pārējais liemenis tiek izmantots cilvēku uzturā.

3.6. Blakusparādības

Liellopi, aitas, cūkas:

Reti (1 līdz 10 dzīvniekiem/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem):	Pastiprinātas jutības reakcija
---	--------------------------------

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam vai tā vietējam pārstāvim vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontaktinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Pēc veterināro zāļu lietošanas uz ādas, hlortetraciklīna uzsūkšanās ir niecīga. Šī iemesla dēļ veterinārās zāles var droši lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Grūsnība:

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Laktācija:

Skatīt 3.12. apakšpunktu „Ierobežojumu periods”.

3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Dati nav pieejami.

Pēc hlortetraciklīna aerosola lietošanas uz ādas, hlortetraciklīna uzsūkšanās ir niecīga. Šī iemesla dēļ mijiedarbība nav sagaidāma.

3.9. Lietošanas veids un devas

Lietošanai uz ādas. Pirms izsmidzināšanas aerosola flakonu rūpīgi sakratīt. Aerosola flakonu turēt apmēram 15-20 cm attālumā no apsmidzināmās vietas. Smidzināt 3 sekundes, līdz vieta kļūst vienmērīgi iekrāsota. Nagu infekciju gadījumā ārstēšanu atkārtot pēc 30 sekundēm. Pret hlortetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu virspusēju brūču infekciju gadījumā ieteicama vienreizēja ārstēšana. Digitālā dermatīta gadījumā ieteicams lietot zāles divas reizes ar 30 sekunžu intervālu, 3 dienas pēc kārtas vienu vai divas reizes dienā. Citu naga infekciju (nagu puves un nagu bojājuma) gadījumā ieteicams lietot zāles divas reizes ar 30 sekunžu intervālu vienu vai divas reizes dienā. Atkarībā no bojājuma smaguma pakāpes un dzīšanas ātruma, ārstēšanu atkārtot pēc 1 līdz 3 dienām.

3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)

Nav piemērojams.

3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku

Nav piemērojami.

3.12. Ierobežojumu periods

Gaļai un blakusproduktiem : nulle dienas.

Pienam: nulle dienas.

Nelietot laktējošiem dzīvniekiem uz tesmeņa, ja pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

4. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

4.1. ATKvet kods:

QD06AA02

4.2. Farmakodinamiskās īpašības

In vitro hlortetraciklīnam primāri piemīt bakteriostatiska iedarbība. Hlortetraciklīns darbojas, inhibējot proteīnu sintēzi baktērijas šūnā. Specifiski, traucēta šūnas dalīšanās un šūnas sienas veidošanās. Hlortetraciklīns piesaistās receptoriem baktērijas ribosomas 30S apakšvienībā, kur tas traucē aminoacil-transporta RNS piesaistīšanos matricas RNS un ribosomas kompleksam.

4.3. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc hlortetraciklīna aerosola lietošanas uz ādas, hlortetraciklīna uzsūkšanās ir niecīga. Šī iemesla dēļ, veterinārajām zālēm ir tikai vietēja iedarbība, sistēmiskā iedarbība nav sagaidāma.

5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

5.1. Būtiska nesaderība

Nav zināma

5.2. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 3 gadi.

5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C.
Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Aerosola flakons atrodas zem spiediena. Karsējot var uzsprāgt. Sargāt no tiešiem saules stariem. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Sargāt no karstuma/karstām virsmām/dzirkstelēm/atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai citiem aizdegšanās avotiem. Necaurdurt un nededzināt aerosola balonu pat pēc zāļu izlietošanas.

5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs

1 aerosola flakons.

Kartona kastīte ar 12 x 1 aerosola flakoniem.

Veterinārās zāles ir iepildītas 211 ml paaugstināta spiediena neapvalkota skārda flakonā ar plastmasas vārsta mehānismu un izsmidzinātāju.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

aniMedica GmbH

7. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)

V/MRP/15/0020

8. PIRMĀS TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 01/07/2015

9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2024

10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PIELIKUMS
MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A. MARKĒJUMS

UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA
UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

{ Kartona kastīte, aerosola flakons }

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Animedazon 2,45% uz ādas lietojams aerosols, suspensija

2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Katrs aerosola flakons satur:

Aktīvā viela:

Hlortetraciklīna hidrohlorīds 3,210 g (atbilst 2,45 masas%)
(atbilst 2,983 g hlortetraciklīna)

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

211 ml

12 x 211 ml

4. MĒRĶSUGAS

Liellopi, aitas, cūkas.

5. INDIKĀCIJAS

6. LIETOŠANAS VEIDI

Lietošanai uz ādas.

Izsmidzināt 3 sekundes, līdz ārstējamā zona ir vienmērīgi iekrāsota, attālums no apsmidzināmās zonas – apmēram 15 – 20 cm.

Nagu infekcijas: atkārtot pēc 30 sekundēm.

Nagu puve un nagu bojājums: apsmidzināt 2 reizes ar 30 sekunžu intervālu 1 vai 2 reizes dienā. Atkārtot no 1 līdz 3 dienām atkarībā no traumas smaguma un dzīšanas ātruma.

Virspusējas brūces: vienreizēja apsmidzināšana pret hlortetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu infekciju ārstēšanai.

Digitalais dermatīts: apsmidzināt 2 reizes ar 30 sekunžu intervālu 3 dienas pēc kārtas, 1 vai 2 reizes dienā.

Pirms izsmidzināšanas rūpīgi sakratīt aerosola flakonu.

Šīs veterinārās zāles var izraisīt nopietnu acu kairinājumu. Aizsargāt acis un seju. Valkāt šķidrumus necaurļaidīgus cimdus.

Neieelpot aerosolu. Lietot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Ja nejauši nokļūst acīs vai tiek norīts, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt aerosola flakonu ārstam.

7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem, pienam : nulle dienas.

Nelietot laktējošiem dzīvniekiem uz tesmeņa, ja pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mēnesis/gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C.

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Aerosola flakons atrodas zem spiediena. Karsējot var uzsprāgt.

Sargāt no tiešiem saules stariem. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C.

Sargāt no karstuma/karstām virsmām/dzirkstelēm/atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai citiem aizdegšanās avotiem.

Necaurdurt un nededzināt aerosola balonu pat pēc zāļu izlietošanas.

10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Bīstami



Apzīmējums “Īpaši viegli uzliesmojošs”.

13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

aniMedica GmbH

14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI

V/MRP/15/0020

15. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Veterināro zāļu nosaukums

Animedazon 2,45% uz ādas lietojams aerosols, suspensija liellopiem, aitām un cūkām

2. Sastāvs

Katrs aerosola flakons satur:

Aktīvā viela:

Hlortetraciklīna hidrohlorīds 3,210 g (atbilst 2,45 masas %)
(atbilst 2,983 g hlortetraciklīna)

Palīgviela(s):

Patentzilais V 85% (E 131):	0,23 g
Izobutāns (propelents)	92,2 g

Vienmērīgi zilas krāsas aerosols.

3. Mērķsugas

Liellopi, aitas, cūkas

4. Lietošanas indikācijas

Pret hlortetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu virspusēju traumatisku vai operācijas brūču infekciju ārstēšanai. Veterinārās zāles var lietot virspusēju ādas un nagu infekciju ārstēšanai, it sevišķi pret hlortetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisīta interdigitālā dermatīta (nagu puves, nagu bojājuma) un digitālā dermatīta gadījumā (Mortellaro slimība).

5. Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām. Nelietot gadījumos, ja zināma rezistence pret tetraciklīniem.

6. Īpaši brīdinājumi

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Aizsargājiet dzīvnieka acis, izsmidzinot veterinārās zāles galvas apvidū. Pirms izsmidzināšanas rūpīgi notīriet apstrādājamo zonu.

Šo veterināro zāļu lietošana jāpamato ar mērķa patogēnu jutības testa rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jābalsta uz vietēja rakstura (reģionālā/ novietnes līmenī) epidemioloģisko informāciju par mērķa patogēnu. Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Dzīvnieks nedrīkst laizīt ārstēto vietu sev vai citiem dzīvniekiem. Pēc zāļu izsmidzināšanas uz nagiem dzīvnieks vismaz stundu jātur uz sausas grīdas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Jāizvairās no tiešas saskares ar ādu sensibilizācijas, kontaktdermatīta un iespējamo hipersensitivitātes reakciju uz hlortetraciklīnu dēļ. Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, jāvalkā piemēroti šķidrumus

necaurīdīgi cimdi. Šīs veterinārās zāles var izraisīt nopietnu acu kairinājumu. Aizsargāt acis un seju. Ja notiek saskare ar ādu vai acīm, nekavējoties nomazgāt skarto vietu ar tīru, svaigu ūdeni. Ja kairinājums nepāriet, vajadzīga medicīniska palīdzība. Neieelpot tvaikus. Lietot veterinārās zāles ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Neēst vai nesmēķēt rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm. Pēc rīkošanās ar zālēm nomazgāt rokas.

Ja zāles tiek nejauši norītas, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojuma marķējumu ārstam.

Skat. arī "Īpaši uzglabāšanas nosacījumi".

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Nav piemērojami.

Citi piesardzības pasākumi:

Iekrāsotā cūkādas daļa jāizgriež pirms pārējais liemenis tiek izmantots cilvēku uzturā.

Grūsnība:

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Laktācija:

Skatīt „Ierobežojumu periods”.

Grūsnība un laktācija:

Pēc Animedazon lietošanas uz ādas, hlortetraciklīna uzsūkšanās ir niecīga. Šī iemesla dēļ Animedazon var droši lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Dati nav pieejami.

Pēc hlortetraciklīna aerosola lietošanas uz ādas, hlortetraciklīna uzsūkšanās ir niecīga. Mijiedarbība nav sagaidāma.

7. Blakusparādības

Liellopi, aitas, cūkas

Reti (1 līdz 10 dzīvniekiem/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem):	Pastiprinātas jutības reakcija
---	--------------------------------

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam vai tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu:

Pārtikas un veterinārais dienests

Peldu iela 30

Rīga, LV-1055

Tīmekļa vietne:

<https://www.pvd.gov.lv/lv>

8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Lietošanai uz ādas. Pirms izsmidzināšanas aerosola flakonu rūpīgi sakratīt. Aerosola flakonu turēt apmēram 15-20 cm attālumā no apsmidzināmās vietas. Smidzināt 3 sekundes, līdz vieta kļūst

vienmērīgi iekrāsota. Nagu infekciju gadījumā ārstēšanu atkārtot pēc 30 sekundēm. Pret hlortetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu virspusēju brūču infekciju gadījumā ieteicama vienreizēja ārstēšana. Digitālā dermatīta gadījumā ieteicams lietot zāles divas reizes ar 30 sekunžu intervālu, 3 dienas pēc kārtas vienu vai divas reizes dienā. Citu naga infekciju (nagu puves un nagu bojājuma) gadījumā ieteicams lietot zāles divas reizes ar 30 sekunžu intervālu vienu vai divas reizes dienā. Atkarībā no bojājuma smaguma pakāpes un dzīšanas ātruma, ārstēšanu atkārtot pēc 1 līdz 3 dienām.

9. Ieteikumi pareizai lietošanai

Skatīt „Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes”.

10. Ierobežojumu periods

Gaļai un blakusproduktiem : nulle dienas.
Pienam: nulle dienas.

Nelietot laktējošiem dzīvniekiem uz tesmeņa, ja pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C.
Neatdzēsēt vai nesasaldēt.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā/ uz kastītes pēc EXP.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Aerosola flakons atrodas zem spiediena. Karsējot var uzsprāgt. Sargāt no tiešiem saules stariem. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C.

Sargāt no karstuma/karstām virsmām/dzirkstelēm/atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai citiem aizdegšanās avotiem.

Necaurdurt un nededzināt aerosola flakonu pat pēc zāļu izlietošanas.

12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

13. Veterināro zāļu klasifikācija

Recepšu veterinārās zāles.

14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi

V/MRP/15/0020

Iepakojuma lielumi:

1 aerosola flakons (211 ml)

Kartona kastīte ar 12 x 1 aerosola flakoniem (211 ml)

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

02/2024

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktinformācija:

Tirdzniecības atļaujas turētājs un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Vācija

Vietējie pārstāvji un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

A/S Dimedium Latvija

Ozolu iela 28

Jaunmārupe

Mārupes nov.

LV-2166

Latvia

Tel.: +371 67610001

Mail: info@dimedium.lv