Di seguito

Terramicina Spray
26,7 mg/ml per uso topico
soluzione alcolica per bovini, ovini, cani e gatti

Terramicina Spray
26,7 mg/ml per uso topico
soluzione alcolica per equidi non destinati alla produzione di alimenti

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Terramicina Spray
26,7 mg/ml per uso topico
soluzione alcolica per bovini, ovini, cani e gatti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 bomboletta da 150 ml di prodotto contiene:

Principio attivo:

Ossitetraciclina cloridrato g 4 (equivalente a 3,7 g di ossitetraciclina base)

Eccipienti: q.b. a 102 g

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione alcolica
Aerosol spray ad uso esclusivamente topico

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Bovini, ovini, cani e gatti.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

La Terramicina Spray è un prodotto ad uso topico indicato nella terapia e prevenzione di tutte le infezioni cutanee sostenute da microrganismi sensibili alla ossitetraciclina. In molti casi, in presenza di infezioni profonde o gravi, è bene accompagnare il trattamento topico con una terapia sistemica.

La Terramicina Spray è indicata nella prevenzione e nel trattamento di:

- ferite traumatiche;
- ferite da battaglia in specie da morso;
- ferite chirurgiche dovute in particolare a castrazione, parto cesareo, decornuazione, taglio della coda, taglio degli orecchi;
- abrasioni, escoriazioni, graffi, punture;

- lesioni dei capezzoli collegate in particolare a mungitura meccanica ed a traumi;
- zoppie, quali la pedaina o zoppina lombarda del bovino e dell'ovino;
- infezioni da batteri conseguenti a dermatiti parassitarie.

4.3 Controindicazioni

Non usare in caso di ipersensibilità nota all'ossitetraciclina o ad uno degli eccipienti.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non spruzzare negli occhi e nella zona adiacente.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Non inalare ed evitare qualsiasi contatto con gli occhi e le altre mucose.

In caso di contatto accidentale degli occhi e delle mucose, risciacquare immediatamente a lungo con acqua.

In caso di contatto accidentale, lavarsi accuratamente le mani e le altre aree cutanee contaminate.

Tenere lontano da fonti infiammabili. Non spruzzare su fiamma e su qualsiasi materiale incandescente.

Persone con sensibilità nota nei confronti delle tetracicline devono evitare il contatto con il prodotto.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Nessuna nota.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Può essere usato durante la gravidanza.

La sicurezza del medicinale veterinario durante l'allattamento non è stata stabilita.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Si verifichi che la superficie da trattare con Terramicina Spray sia pulita. Altrimenti pulire accuratamente ed a fondo asportando corpi estranei, pus, essudati, parti necrosate, peli.

Prima dell'uso agitare la bomboletta di Terramicina Spray, quindi eseguire l'applicazione tenendo la bomboletta ad una distanza di 16-20 cm dalle superfici da spruzzare.

La quantità di farmaco che va spruzzata è connessa alla gravità ed estensione delle lesioni, tuttavia, si consiglia di spruzzare la superficie interessata per 1-2 secondi.

È utile ripetere il trattamento anche tre volte al giorno fino a guarigione dell'animale.

La dose è pari a circa 1,47 ml/secondo, equivalenti a circa 39,2 mg/secondo di ossitetraciclina cloridrato.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Dati non disponibili.

Non superare le dosi indicate.

4.11 Tempi di attesa

Bovini e ovini: carne e visceri: zero giorni.

Latte: zero ore.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Codice ATC vet: QD06AA03 OXITETRACICLINA

Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

La Terramicina Spray contiene ossitetraciclina, un prodotto caratterizzato da un ampio spettro d'azione, dotato di grande efficacia nel trattamento di numerose malattie sostenute da microrganismi Gram positivi e Gram negativi, ivi compresi *F. necrophorus* e *F. nodosus*.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

La Terramicina Spray è un prodotto in soluzione alcolica, che permette una rapida essiccazione del farmaco a livello delle superfici trattate. Al contrario dei prodotti in veicolo oleoso la rapida essiccazione evita che la regione trattata si imbratti al contatto di paglia, terra ed altre sostanze.

La Terramicina Spray è facilmente applicabile. Con essa si possono raggiungere tutte le regioni della cute dell'animale, anche le meno accessibili. La bomboletta, infatti, è dotata di un particolare meccanismo che permette la somministrazione del farmaco in modo omogeneo anche operando con contenitore capovolto.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Patent blue V

Polisorbato 80

Alcool isopropilico

N-Butano (come propellente)

6.2 Incompatibilità

Nessuna nota.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco.

Recipiente sotto pressione: proteggere dalla luce e dalle alte temperature.

Non perforare né bruciare dopo l'uso. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Contenitore metallico con valvola di erogazione contenente 150 ml di prodotto.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei materiali di scarto derivanti dal suo utilizzo.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Zoetis Italia S.r.l.
Via Andrea Doria, 41 M
00192 Roma

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Bomboletta contenente 150 ml: A.I.C. n. 100156013

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

18 Luglio 1979 / 1 gennaio 2009

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Gennaio 2014

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Non pertinente.

MODALITÀ DI DISPENSAZIONE

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

**INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO
etichetta/foglietto illustrativo**

TERRAMICINA SPRAY 26,7 mg/ml soluzione alcolica aerosol spray da 150 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Terramicina Spray

26,7 mg/ml soluzione alcolica
aerosol spray da 150 ml
per bovini, ovini, cani e gatti
(ossitetraciclina cloridrato)

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 bomboletta da 150 ml di prodotto contiene:

Principio attivo: ossitetraciclina cloridrato g 4 (equivalente a 3,7 g di ossitetraciclina base)

Eccipienti: q.b. a 102 g

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione alcolica
Aerosol spray ad uso esclusivamente topico

4. CONFEZIONE

Bomboletta spray contenente 150 ml di prodotto

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, ovini, cani e gatti

6. INDICAZIONI

La Terramicina Spray è un prodotto ad uso topico indicato nella terapia e prevenzione di tutte le infezioni cutanee sostenute da microrganismi sensibili alla ossitetraciclina. In molti casi, in presenza di infezioni profonde o gravi, è bene accompagnare il trattamento topico con una terapia sistemica.

La Terramicina Spray è indicata nella prevenzione e nel trattamento di:

- ferite traumatiche;
- ferite da battaglia in specie da morso;
- ferite chirurgiche dovute in particolare a castrazione, parto cesareo, decornuazione, taglio della coda, taglio degli orecchi;
- abrasioni, escoriazioni, graffi, punture;
- lesioni dei capezzoli collegate in particolare a mungitura meccanica ed a traumi;
- zoppie, quali la pedaina o zoppina lombarda del bovino e dell'ovino;
- infezioni da batteri conseguenti a dermatiti parassitarie.

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Si verifichi che la superficie da trattare con Terramicina Spray sia pulita. Altrimenti pulire accuratamente ed a fondo asportando corpi estranei, pus, essudati, parti necrosate, peli.

Prima dell'uso agitare la bomboletta di Terramicina Spray, quindi eseguire l'applicazione tenendo la bomboletta ad una distanza di 16-20 cm dalle superfici da spruzzare.

La quantità di farmaco che va spruzzata è connessa alla gravità ed estensione delle lesioni, tuttavia, si consiglia di spruzzare la superficie interessata per 1-2 secondi.

È utile ripetere il trattamento anche tre volte al giorno fino a guarigione dell'animale.

La dose è pari a circa 1,47 ml/secondo, equivalenti a circa 39,2 mg/secondo di ossitetraciclina cloridrato.

8. TEMPO DI ATTESA

Tempo di attesa:

Bovini e ovini:

Carne e visceri: zero giorni.

Latte: zero ore.

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non spruzzare negli occhi e nella zona adiacente.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Non inalare ed evitare qualsiasi contatto con gli occhi e le altre mucose.

In caso di contatto accidentale degli occhi e delle mucose, risciacquare immediatamente a lungo con acqua.

In caso di contatto accidentale, lavarsi accuratamente le mani e le altre aree cutanee contaminate.

Tenere lontano da fonti infiammabili. Non spruzzare su fiamma e su qualsiasi materiale incandescente.

Persone con sensibilità nota nei confronti delle tetracicline devono evitare in contatto con il prodotto.

Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Nessuna nota.

Se dovessero verificarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta si prega avvisare il veterinario.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Può essere usato durante la gravidanza.

La sicurezza del medicinale veterinario durante l'allattamento non è stata stabilita.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio

Dati non disponibili. Non superare le dosi indicate.

Incompatibilità

Nessuna nota.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD {mese/anno}

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco.
Recipiente sotto pressione: proteggere dalla luce e dalle alte temperature.
Non perforare né bruciare dopo l'uso. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario.
Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare A.I.C.:
Zoetis Italia S.r.l.
Via Andrea Doria, 41 M
00192 Roma

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:
IGS Aerosol GmbH
Im Hemmet 1
79664 Wehr/Baden (Germania)

16. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n. 100156013

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto

ALTRE INFORMAZIONI

Proprietà farmacodinamiche

La Terramicina Spray contiene ossitetraciclina, un prodotto caratterizzato da un ampio spettro d'azione, dotato di grande efficacia nel trattamento di numerose malattie sostenute da microrganismi Gram positivi e Gram negativi, ivi compresi *F. necrophorus* e *F. nodosus*.

Informazioni farmacocinetiche

La Terramicina Spray è un prodotto in soluzione alcolica, che permette una rapida essiccazione del

farmaco a livello delle superfici trattate. Al contrario dei prodotti in veicolo oleoso la rapida essiccazione evita che la regione trattata si imbratti al contatto di paglia, terra ed altre sostanze.

La Terramicina Spray è facilmente applicabile. Con essa si possono raggiungere tutte le regioni della cute dell'animale, anche le meno accessibili. La bomboletta, infatti, è dotata di un particolare meccanismo che permette la somministrazione del farmaco in modo omogeneo anche operando con contenitore capovolto.

Per Scadenza e Numero di lotto vedere la base della bomboletta.

- RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Terramicina Spray
26,7 mg/ml per uso topico
soluzione alcolica per equidi non destinati alla produzione di alimenti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 bomboletta da 150 ml di prodotto contiene:

Principio attivo:

Ossitetraciclina cloridrato g 4 (equivalente a 3,7 g di ossitetraciclina base)

Eccipienti: q.b. a 102 g

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione alcolica
Aerosol spray ad uso esclusivamente topico

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Equidi non destinati alla produzione di alimenti.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

La Terramicina Spray è un prodotto ad uso topico indicato nella terapia e prevenzione di tutte le infezioni cutanee sostenute da microrganismi sensibili alla ossitetraciclina. In molti casi, in presenza di infezioni profonde o gravi, è bene accompagnare il trattamento topico con una terapia sistemica.

La Terramicina Spray è indicata nella prevenzione e nel trattamento di:

- ferite traumatiche;
- ferite da morso;
- ferite chirurgiche dovute in particolare a castrazione e parto cesareo;
- abrasioni, escoriazioni, graffi, punture;
- lesioni dei capezzoli;
- zoppie;

- interventi di mascalcia, focature del cavallo;
- infezioni da batteri conseguenti a dermatiti parassitarie.

4.3 Controindicazioni

Non usare in caso di ipersensibilità nota all'ossitetraciclina o ad uno degli eccipienti.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non spruzzare negli occhi e nella zona adiacente.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Non inalare ed evitare qualsiasi contatto con gli occhi e le altre mucose.

In caso di contatto accidentale degli occhi e delle mucose, risciacquare immediatamente a lungo con acqua.

In caso di contatto accidentale, lavarsi accuratamente le mani e le altre aree cutanee contaminate.

Tenere lontano da fonti infiammabili. Non spruzzare su fiamma e su qualsiasi materiale incandescente. Persone con ipersensibilità nota nei confronti delle tetracicline devono evitare il contatto con il prodotto.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Nessuna nota.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Può essere usato durante la gravidanza.

La sicurezza del medicinale veterinario durante l'allattamento non è stata stabilita.

4.8 Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Si verifichi che la superficie da trattare con Terramicina Spray sia pulita. Altrimenti pulire accuratamente ed a fondo asportando corpi estranei, pus, essudati, parti necrosate, peli.

Prima dell'uso agitare la bomboletta di Terramicina Spray, quindi eseguire l'applicazione tenendo la bomboletta ad una distanza di 16-20 cm dalle superfici da spruzzare.

La quantità di farmaco che va spruzzata è connessa alla gravità ed estensione delle lesioni, tuttavia, si consiglia di spruzzare la superficie interessata per 1-2 secondi.

È utile ripetere il trattamento anche tre volte al giorno fino a guarigione dell'animale.

La dose è pari a circa 1,47 ml/secondo, equivalenti a circa 39,2 mg/secondo di ossitetraciclina cloridrato.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Dati non disponibili.

Non superare le dosi indicate.

4.11 Tempo di attesa

Non pertinente.

Il prodotto non deve essere somministrato ad equidi destinati alla produzione di alimenti.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Codice ATC vet: QD06AA03 OXITETRACICLINA

Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico

5.1 Proprietà farmacodinamiche

La Terramicina Spray contiene ossitetraciclina, un prodotto caratterizzato da un ampio spettro d'azione, dotato di grande efficacia nel trattamento di numerose malattie sostenute da microrganismi Gram positivi e Gram negativi.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

La Terramicina Spray è un prodotto in soluzione alcolica, che permette una rapida essiccazione del farmaco a livello delle superfici trattate. Al contrario dei prodotti in veicolo oleoso la rapida essiccazione evita che la regione trattata si imbratti al contatto di paglia, terra ed altre sostanze.

La Terramicina Spray è facilmente applicabile. Con essa si possono raggiungere tutte le regioni della cute dell'animale, anche le meno accessibili. La bomboletta, infatti, è dotata di un particolare meccanismo che permette la somministrazione del farmaco in modo omogeneo anche operando con contenitore capovolto.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Patent blue V

Polisorbato 80

Alcool isopropilico

N-Butano (come propellente)

6.2 Incompatibilità

Nessuna nota.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco.

Recipiente sotto pressione: proteggere dalla luce e dalle alte temperature.

Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Contenitore metallico con valvola di erogazione contenente 150 ml di prodotto.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei materiali di scarto derivanti dal suo utilizzo.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Zoetis Italia S.r.l.
Via Andrea Doria, 41 M
00192 Roma

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Bomboletta contenente 150 ml: A.I.C. n. 100156025

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

18 Luglio 1979 / 1 gennaio 2009

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Gennaio 2014

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Non pertinente.

MODALITÀ DI DISPENSAZIONE

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO
etichetta/foglietto illustrativo

TERRAMICINA SPRAY 26,7 mg/ml soluzione alcolica aerosol spray da 150 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Terramicina Spray

26,7 mg/ml soluzione alcolica

aerosol spray da 150 ml

per equidi non destinati alla produzione di alimenti

(ossitetraciclina cloridrato)

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 bomboletta da 150 ml di prodotto contiene:

Principio attivo: ossitetraciclina cloridrato g 4 (equivalente a 3,7 g di ossitetraciclina base)

Eccipienti: q.b. a 102 g

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione alcolica

Aerosol spray ad uso esclusivamente topico

4. CONFEZIONE

Bomboletta spray contenente 150 ml di prodotto

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Equidi non destinati alla produzione di alimenti

6. INDICAZIONI

La Terramicina Spray è un prodotto ad uso topico indicato nella terapia e prevenzione di tutte le infezioni cutanee sostenute da microrganismi sensibili alla ossitetraciclina. In molti casi, in presenza di infezioni profonde o gravi, è bene accompagnare il trattamento topico con una terapia sistemica.

La Terramicina Spray è indicata nella prevenzione e nel trattamento di:

- ferite traumatiche;
- ferite da morso;
- ferite chirurgiche dovute in particolare a castrazione e parto cesareo;
- abrasioni, escoriazioni, graffi, punture;
- lesioni dei capezzoli;
- zoppie;
- interventi di mascaia, focature del cavallo;
- infezioni da batteri conseguenti a dermatiti parassitarie.

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Si verifichi che la superficie da trattare con Terramicina Spray sia pulita. Altrimenti pulire accuratamente ed a fondo asportando corpi estranei, pus, essudati, parti necrosate, peli.

Prima dell'uso agitare la bomboletta di Terramicina Spray, quindi eseguire l'applicazione tenendo la bomboletta ad una distanza di 16-20 cm dalle superfici da spruzzare.

La quantità di farmaco che va spruzzata è connessa alla gravità ed estensione delle lesioni, tuttavia, si consiglia di spruzzare la superficie interessata per 1-2 secondi.

È utile ripetere il trattamento anche tre volte al giorno fino a guarigione dell'animale.

La dose è pari a circa 1,47 ml/secondo, equivalenti a circa 39,2 mg/secondo di ossitetraciclina cloridrato.

8. TEMPO DI ATTESA

Tempo di attesa: non pertinente.

Il prodotto non deve essere somministrato ad equidi destinati alla produzione di alimenti.

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non spruzzare negli occhi e nella zona adiacente.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Non inalare ed evitare qualsiasi contatto con gli occhi e le altre mucose.

In caso di contatto accidentale degli occhi e delle mucose, risciacquare immediatamente a lungo con acqua.

In caso di contatto accidentale, lavarsi accuratamente le mani e le altre aree cutanee contaminate.

Tenere lontano da fonti infiammabili. Non spruzzare su fiamma e su qualsiasi materiale incandescente.

Persone con ipersensibilità nota nei confronti delle tetracicline devono evitare il contatto con il prodotto.

Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Nessuna nota.

Se dovessero verificarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta si prega informare il veterinario.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Può essere usato durante la gravidanza.

La sicurezza del medicinale veterinario durante l'allattamento non è stata stabilita.

Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Nessuna conosciuta.

Sovradosaggio

Dati non disponibili. Non superare le dosi indicate.

Incompatibilità

Nessuna nota.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD {mese/anno}

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco.
Recipiente sotto pressione: proteggere dalla luce e dalle alte temperature.
Non perforare né bruciare dopo l'uso. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario.
Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare A.I.C.:
Zoetis Italia S.r.l.
Via Andrea Doria, 41 M
00192 Roma

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:
IGS Aerosol GmbH
Im Hemmet 1
79664 Wehr/Baden (Germania)

16. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

AIC n. 100156025

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto

ALTRE INFORMAZIONI

Proprietà farmacodinamiche

La Terramicina Spray contiene ossitetraciclina, un prodotto caratterizzato da un ampio spettro d'azione, dotato di grande efficacia nel trattamento di numerose malattie sostenute da microrganismi Gram positivi e Gram negativi.

Informazioni farmacocinetiche

La Terramicina Spray è un prodotto in soluzione alcolica, che permette una rapida essiccazione del farmaco a livello delle superfici trattate. Al contrario dei prodotti in veicolo oleoso la rapida essiccazione evita che la regione trattata si imbratti al contatto di paglia, terra ed altre sostanze.

La Terramicina Spray è facilmente applicabile. Con essa si possono raggiungere tutte le regioni della cute dell'animale, anche le meno accessibili. La bomboletta, infatti, è dotata di un particolare meccanismo che permette la somministrazione del farmaco in modo omogeneo anche operando con contenitore capovolto.

Per Scadenza e Numero di lotto vedere la base della bomboletta.