

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

TAbic IB VAR šnypščioji tabletė suspensijai ruošti vištomis

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje vakcinos dozėje yra:

Veiklioji medžiaga:

Gyvo 233A var-1 padermės paukščių infekcinio bronchito viruso, ne mažiau kaip $10^{3.2}$ EID₅₀ ir ne daugiau kaip $10^{5.1}$ EID₅₀*

* EID₅₀ – 50 % embrionų užkrečianti dozė. (Statistiškai nustatomas viruso kiekis, kuris tikėtina gali užkrėsti 50 procentų apvaisintų kiaušinių į kuriuos jis inokuliuotas).

Pagalbinės medžiagos:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Trehalozė
Natrio-vandenilio karbonatas
Citrinų rūgštis
Magnio stearatas

Beveik balta apvali šnypščioji tabletė.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos (broileriai, dedeklės ir tėviniai pulkai).

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Viščiukams broileriams, tėviniams pulkams ir dedeklėms aktyviai imunizuoti, norint sumažinti virulentinio infekcinio bronchito viruso, sukeltą mirtingumą, klinikinius požymius ir pažeidimus. Vakciną galima naudoti bet kokio amžiaus viščiukams, pradedant nuo vienos dienos. Net vienkartinė vakcinacija gali greitai padidinti imunitetą infekcinio bronchito virusui. Tėviniai pulkai ir dedeklės vėliau taip pat turėtų būti revakcinuojami pagal nustatytą vakcinacijos programą.

Imuniteto pradžia: 21 diena po vakcinavimo.

Imuniteto trukmė: 42 dienos po vakcinavimo. Broilerių pulkų, kurie skerdziami apie 7–8 amžiaus savaitę, pakartotina vakcinacija (1-ą ir 14-ą amžiaus dieną) pilnai juos apsaugo.

3.3. Kontraindikacijos

Negalima vakcinuoti paukščių, kuriems pasireiškė klinikiniai požymiai, arba kurie veikiami streso.

3.4. Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Daugybė faktorių, įskaitant imunosupresines ligas, mitybos statusą ir stresą, gali sutrikdyti gyvūnų tinkamą imuninės sistemos veiklą.

Vakcininės padermės mikroorganizmai gali išplisti tarp imlių gyvūnų rūšių. Reikėtų imtis specialių atsargumo priemonių, kad vakcininės padermės mikroorganizmai neišplistų tarp skirtingo amžiaus gyvūnų.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės, t.y. pirštinės, apsauginiai akiniai ir kaukė.

Atsitiktinai priėjus ar užtiškus ant odos, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujami reiškiniai

Nėra.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Dedantys kiaušinius paukščiai

Vakcina gali būti naudojama dedeklėms vakcinuoti nuo 1-os dienos amžiaus.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima naudoti tą pačią dieną, bet negalima maišyti su gyvomis vakcinomis nuo Niukaslų ligos. Nėra duomenų apie šios vakcinės saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Skirta naudoti inhaliacijoms. Vakcinuojama purškiant stambiais lašais ar aerozoliu.

Rekomenduojamas vakcinacijos laikas – nuo 1-os amžiaus dienos.

Vakcinės paruošimas:

Ištirpinti vakcinės tabletes tik švariame gryname vandenyje (šaltame virintame). Nenaudokite vandens su dezinfekavimo ar valymo priemonės likučiais.

Paspaudus lizduotę, išlaisvintą tabletę įmesti į vandenį. Palaukti 1–2 min. kol tabletė pilnai išsisklaidys, lėtai išmaišyti, kad būtų užtikrintas vakcinės homogeniškumas.

Vakcinuoti gyvūnus tik tada, kai tabletė pilnai ištirpusi.

Šis paruoštas preparatas yra beveik skaidri, šiek tiek drumsta suspensija.

Ši vakcina negali būti naudojama, jei visa tabletė neištirpusi arba visiškai neištirpusi arba tabletė yra netinkamos išvaizdos, pvz., pakitusios spalvos ar tabletė yra išsipūtusi.

Nenaudoti tablečių iš pradurtų lizdinių pakuočių.

Nelaikyti bet kokios nepanaudotos vakcinės porcijos kitos dienos naudojimui. Negalima naudoti per mažos dozės. Atskiedus vandeniu, vakcina turi būti sunaudota ilgiausiai per 2 val., bet rekomenduotina vakciną sugirdyti tuoj pat.

Rekomenduotini skiedimo tūriai (ml):

Dozės	Purškimas stambiais lašais*	Aerozolis *
1 000	50–300	100–150
2 000	100–600	200–300
2 500	125–750	250–375
5 000	250–1 500	500–750
10 000	500–3 000	1 000–1 500

* Tikslus vandens kiekis priklauso nuo naudojamo aparato vandens išeigos: purškimas stambiais ar smulkiais lašais.

Priemonės:

Purškimas stambiais lašais: Purkštuvus, kuriuos dažniausiai naudoja daržininkystėje, galima naudoti purkšti vienadienius viščiukus, ką tik iš inkubatoriaus ar bruderio. Vyresniems paukščiams reikia naudoti elektrinius purkštuvus arba ant nugaros nešiojamus purkštuvus, kurie purškia vienodžiau. Lašai neturi būti mažesni nei 100 µm.

Aerozolis: Elektriniu ant nugaros nešiojamu purkštuvu išpurškiami lašai turi būti 40–100 µm dydžio. Šis metodas naudojamas pakartotinei vakcinacijai vyresniame amžiuje.

Nuorodos dėl tinkamo naudojimo:

Naudojami stambaus lašo ir aerozolinės sistemos aparatai turi būti išvalyti tekančiu virintu karštu vandeniu. Purkštukų efektyvumas turi būti patikrintas prieš vakcinaciją. Stambaus lašo purkštuvai ir aerozolinės sistemos turi būti nukreiptos virš paukščių 60–70 cm atstumu. Prieš purškimą paukštidėse reikia sumažinti apšvietimą ir išjungti ventiliatorius bei šildytuvus. Vakcinacijos metu ir po jos paukščiams reikia užtikrinti ramybę.

Imunologinis atsakas į vakcinės antigeną bus sumažėjęs, jei ji bus laikoma arba vartojama netinkamai.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Nustatyta, kad vakcina buvo saugi 1-os dienos amžiaus SPF viščiukams įlašinus į akį mažiausiai 10 kartų didesnę nei rekomenduotina dozę.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

Nulis parų.

4. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas:

QI01AA03

Ši vakcina skatina formuotis aktyvų imunitetą nuo paukščių infekcinio bronchito virus. Vakcinoje yra gyvo nusilpninto infekcinio bronchito viruso, kultivuoto apvaisintuose kiaušiniuose iš SPF pulkų, šalčiu sudžiovinto ir supakuoto į lizduotes tablečių pavidalu.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės: 2 metai.
Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus: 2 val.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).
Saugoti nuo šviesos.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Tabletės (1000, 2000, 2500, 5000 ar 10 000 dozių) supakuotos į dvisluoksnes aliuminines lizduotes: Alum Soft Silver (PVC/PVDC)-Alum Silver (PVC).
Kiekvienoje lizduotėje yra po 10 tablečių.
PVC: polivinilchloridas, PVDC: polivinilideno chloridas.
Kartoninėje dėžutėje yra 1 lizduotė (10 tablečių).

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Phibro Animal Health (Poland) Sp. Z o.o.

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/14/2266/001-005

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2014-11-27.

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2025-06-26

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**Kartoninė dėžutė****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

TABIC IB VAR šnypščioji tabletė suspensijai

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)IBV, padermė 233A, $10^{3.2}$ - $10^{5.1}$ EID₅₀/dozėje**3. PAKUOTĖS DYDIS**

10 x 1 000 (2 000, 2 500, 5 000, 10 000) d

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Vištos (broileriai, dedeklės ir tėviniai pulkai).

**5. INDIKACIJA (-OS)****6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**

Naudoti inhaliacijoms (purškiant stambiais lašais ar aerozoliu).

7. IŠLAUKA

Išlauka: nulis parų.

8. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

Paruošus sunaudoti per 2 valandas.

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti šaldytuve.

Saugoti nuo šviesos.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“
--

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS



14. REGISTRACIJOS NUMERIAI

LT/2/14/2266/001-005

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Aliumininės lizduotės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

TAbic IB VAR

2. VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKYBINĖ INFORMACIJA

IBV, padermė 233A, $10^{3,2}$ - $10^{5,1}$ EID₅₀/dozėje

3. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

Papildoma informacija:

1000 (2 000, 2 500, 5 000, 10 000) d

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

TAbic IB VAR šnypščioji tabletė suspensijai ruošti vištomis

2. Sudėtis

1 dozėje yra:

Veiklioji medžiaga:

Gyvo 233A var-1 padermės paukščių infekcinio bronchito viruso, ne mažiau kaip $10^{3.2}$ EID₅₀ ir ne daugiau kaip $10^{5.1}$ EID₅₀*

* EID₅₀ = 50 % embrionų užkrečianti dozė. (Statistiškai nustatomas viruso kiekis, kuris tikėtina gali užkrėsti 50 procentų apvaisintų kiaušinių į kuriuos jis paskiepytas).

Beveik balta, apvali šnypščioji tabletė.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos (broileriai, dedeklės, tėviniai pulkai).



4. Naudojimo indikacijos

Viščiukams broileriams, tėviniams pulkams ir dedeklėms aktyviai imunizuoti, norint sumažinti virulentinio infekcinio bronchito viruso sukeltą mirtingumą, klinikinius požymius ir pažeidimus. Vakciną galima naudoti bet kokio amžiaus viščiukams, pradedant nuo vienos dienos. Net vienkartinė vakcinacija gali greitai padidinti imunitetą infekcinio bronchito virusui. Tėviniai pulkai ir dedeklės vėliau taip pat turėtų būti revakcinuojami pagal nustatytą vakcinacijos programą.

Imuniteto pradžia: 21 diena po vakcinavimo.

Imuniteto trukmė: 42 dienos po vakcinavimo. Broilerių pulkų, kurie skerdomi apie 7–8 amžiaus savaitę, pakartotina vakcinacija (1-ą ir 14-ą amžiaus dieną) pilnai juos apsaugo.

5. Kontraindikacijos

Negalima vakcinuoti paukščių, kuriems pasireiškė klinikiniai požymiai, arba kurie veikiami streso.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Daugybė faktorių, įskaitant imunosupresines ligas, mitybos statusą ir stresą, gali sutrikdyti gyvūnų tinkamą imuninės sistemos veiklą.

Vakcininės padermės mikroorganizmai gali išplisti tarp imlių gyvūnų rūšių. Reikėtų imtis specialių atsargumo priemonių, kad vakcininės padermės mikroorganizmai neišplistų tarp skirtingo amžiaus gyvūnų.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės, t.y. pirštinės, apsauginiai akiniai ir kaukė.

Atsitiktinai prarijus produkto ar užtiškus ant odos, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Dedantys kiaušinius paukščiai

Vakcina gali būti naudojama dedeklėms vakcinuoti nuo 1-os dienos amžiaus.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima naudoti tą pačią dieną, bet negalima maišyti su gyvomis vakcinomis nuo Niukaslo ligos. Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Perdozavimas

Nustatyta, kad vakcina buvo saugi 1-os dienos amžiaus SPF viščiukams įlašinus į akį mažiausiai 10 kartų didesnę nei rekomenduotina dozę.

Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

7. Nepageidaujami reiškiniai

Nėra.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokius nepageidaujamus reiškinius taip pat galite pranešti registruotojui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

El. paštas: vaistu.registracija@vmvt.lt

Pranešimo forma:

<https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Skirta naudoti inhaliacijoms. Vakcinuojama purškiant stambiais lašais ar aerozoliu.

Rekomenduojamas vakcinacijos laikas –nuo 1-os dienos amžiaus.

Vakcinos paruošimas:

Ištirpinti vakcinos tabletes tik švariame gryname vandenyje (šaltame virintame). Nenaudokite vandens su dezinfekavimo ar valymo priemonės likučiais.

Paspaudus lizduotę, išlaisvintą tabletę įmesti į vandenį. Palaukti 1–2 min. kol tabletė pilnai išsisklaidys, lėtai išmaišyti, kad būtų užtikrintas vakcinos homogeniškumas.

Vakcinuoti gyvūnus tik tada, kai tabletė pilnai ištirpusi.

Šis paruoštas preparatas yra beveik skaidri, šiek tiek drumsta suspensija.

Nenaudoti tablečių iš pradurtų lizdinių pakuočių.

Nelaikyti bet kokios nepanaudotos vakcinės porcijos kitos dienos naudojimui. Negalima naudoti per mažos dozės.

Atskiedus vandeniu, vakcina turi būti sunaudota ilgiausiai per 2 val., bet rekomenduotina vakciną sugirdyti tuoj pat.

Rekomenduotini skiedimo tūriai (ml):

Dozės	Purškimas stambiais lašais*	Aerozolis *
1 000	50–300	100–150
2 000	100–600	200–300
2 500	125–750	250–375
5 000	250–1 500	500–750
10 000	500–3 000	1 000–1 500

* Tikslus vandens kiekis priklauso nuo naudojamo aparato vandens išeigos: purškimas stambiais ar smulkiais lašais.

Priemonės:

Purškimas stambiais lašais (inhaliacija): Purkštuvus, kuriuos dažniausiai naudoja daržininkystėje, galima naudoti purkšti vienadienius viščiukus, ką tik iš inkubatoriaus ar bruderio. Vyresniems paukščiams reikia naudoti elektrinius purkštuvus arba ant nugaros nešiojamus purkštuvus, kurie purškia vienodžiau. Lašai neturi būti mažesni nei 100 µm.

Aerozolis: Elektriniu ant nugaros nešiojamu purkštuvu išpurškiami lašai turi būti 40–100 µm dydžio. Šis metodas naudojamas pakartotinei vakcinacijai vyresniame amžiuje.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Naudojami stambaus lašo ir aerozolinės sistemos aparatai turi būti išvalyti tekančiu virintu karštu vandeniu. Purkštukų efektyvumas turi būti patikrintas prieš vakcinaciją. Stambaus lašo purkštuvai ir aerozolinės sistemos turi būti nukreiptos virš paukščių 60–70 cm atstumu. Prieš purškimą paukštidėse reikia sumažinti apšvietimą ir išjungti ventiliatorius bei šildytuvus. Vakcinacijos metu ir po jos paukščiams reikia užtikrinti ramybę.

Imunologinis atsakas į vakcinės antigeną bus sumažėjęs, jei ji bus laikoma arba vartojama netinkamai.

Nevartokite šios vakcinės, jeigu pastebite, kad visa tabletė ne iki galo ištirpusi arba visai neištirpusi, arba jos išvaizda netinkama, pvz., pakitusi spalva arba ji išbrinkusi.

10. Išlauka

Nulis parų.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant lizdinės plokštelės po Exp. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus – 2 val.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/14/2266/001-005

Pakuočių dydžiai:

Tabletės (1000, 2000, 2500, 5000 ar 10 000 dozių) supakuotos į lizduotes.
Kartoninėje dėžutėje yra 1 lizduotė (10 tablečių).

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2025 m. birželio mėn.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamus nepageidaujamus reiškinius:

Phibro Animal Health (Poland) Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Lenkija
Email: pv.polska@pahc.com
Tel: +48 607 380 360

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Synoptis Industrial Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 15
62-020 Swarzędz
Lenkija

17. Kita informacija

Ši vakcina skatina formuotis aktyvų imunitetą nuo paukščių infekcinio bronchito virus. Vakcinoje yra gyvo nusilpninto infekcinio bronchito viruso, kultivuoto apvaisintuose kiaušiniuose iš SPF pulkų, šalčiu sudžiovinto ir supakuoto į lizduotes tablečių pavidalu. Parduodama tik veterinarijos gydytojui.