

## **OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO**

## **A. OZNAČEVANJE**

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**

ŠKATLA 100 ml in 250 ml

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje

**2. NAVEDBA UČINKOVIN**Vsak ml vsebuje:  
florfenikol ... 300 mg**3. VELIKOST PAKIRANJA**100 ml  
250 ml**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo, ovce in prašiči.

**5. INDIKACIJA(E)****6. POTI UPORABE**Govedo: intramuskularna ali subkutana uporaba  
Ovce: intramuskularna uporaba  
Prašiči: intramuskularna uporaba**7. KARENCA**

Karenca:

Govedo:

Meso in organi:           po i.m. poti:       30 dni  
  po s.c. poti:       44 dni

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Ne uporabite pri bregih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ovce:

Meso in organi:           po i.m. poti:       39 dni

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Ne uporabite pri bregih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Prašiči:

Meso in organi:           po i.m. poti:       18 dni

**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mesec/leto}

Po prvem odpiranju porabite v 28 dneh.  
Odrpno zdravilo uporabite do .....

**9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte pri temperaturi pod 30 °C.  
Ne zamrzujte.

**10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”**

Samo za živali.

**12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**13.  
IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

LIVISTO Int'l, S.L.

**16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

DC/V/0572/001

**17. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {številka}

**PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI****VIALA 100 ml in 250 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje  
florfenikol

**2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)**

Vsak ml vsebuje:  
florfenikol..... 300 mg

**3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo, ovce in prašiči.

**4. POTI UPORABE**

Govedo: intramuskularna ali subkutana uporaba  
Ovce: intramuskularna uporaba  
Prašiči: intramuskularna uporaba  
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**5. KARENCA**

Karenca:

Govedo:

Meso in organi:	po i.m. poti:	30 dni
	po s.c. poti:	44 dni

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Ne uporabite pri bregih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ovce:

Meso in organi:	po i.m. poti:	39 dni
-----------------	---------------	--------

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Ne uporabite pri bregih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Prašiči:

Meso in organi:	po i.m. poti:	18 dni
-----------------	---------------	--------

**6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mesec/leto}

Po prvem odpiranju porabite v 28 dneh.

Odprto zdravilo uporabite do .....

**7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte pri temperaturi pod 30 °C.  
Ne zamrzujte.

**8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

LIVISTO Int'l, S.L.

**9. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {številka}