

NAVODILO IN STIČNA OZ. PRIMARNA OVOJNINA (vrečka) sta zaradi opremljanja združeni

NAVODILO ZA UPORABO

Piperazin Citrat Genera 1 g peroralni prašek

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

Proizvajalec, odgovoren za sproščanje serij:

GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvaška

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Piperazin Citrat Genera 1 g peroralni prašek

3. NAVEDBA UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

1 g peroralnega praška vsebuje:

Učinkovina:

piperazinijev citrat 1 g

Pomožne snovi: Zdravilo ne vsebuje pomožnih snovi.

4. INDIKACIJE

- zdravljenje in zatiranje askaridoze pri vseh ciljnih živalskih vrstah. Močneje deluje proti odraslim kot proti razvojnim oblikam parazitov.

- ezofagostomoza pri prašičih

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite pri živalih s kronično okvaro jeter ali ledvic.

Ne uporabite v primerih preobčutljivosti na učinkovino.

6. NEŽELENI UČINKI

Če opazite neželene učinke tega zdravila, takoj obvestite pristojni organ za farmakovigilanco in imetnika dovoljenja za promet.

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči, kokoši in golobi.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Prašek Piperazin citrat dajemo živalim raztopljen v vodi ali individualno posamezni živali tako, da posipamo predpisani odmerek po manjši količini hrane, ki jo bo žival zagotovo pojedla.

Živalim 12 ur pred dajanjem Piperazin citrata ne dajemo hrane niti vode.

Odmerki:

Prašiči	3 g na 10 kg telesne mase
Kokoši	0,25 do 0,5 g na 1 kg telesne mase (2 dni zapored)
Golobi	0,25-0,5 g/1 kg telesne mase

Za skupinsko zdravljenje prašičev in kokoši dajemo zdravilo v enodnevnem obroku vode za pitje v odmerku 10 g zdravila na 3 litre vode.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Glejte poglavje 8.

10. KARENCA

Prašiči: meso in organi: 4 dni

Kokoši: meso in organi: 4 dni

jajca: 4 dni

Ni dovoljena uporaba pri golobih, ki so namenjeni za prehrano ljudi.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

Shranjujte na suhem mestu.

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo je označen na ovojnini (3 leta).

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 6 mesecev.

Rok uporabnosti po rekonstituciji v skladu z navodili: 24 ur

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini po EXP.

12. POSEBNA OPOZORILA

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:

Spodaj navedene prakse povečujejo tveganje za nastanek rezistence in lahko povzročijo neučinkovitost zdravljenja, zato se je treba izogibati:

- prepogosti in ponavljajoči uporabi antihelmintikov istega razreda skozi daljše časovno obdobje

- premajhnim odmerkom, ki so lahko posledica določitve prenizke telesne mase, napak pri dajanju zdravila ali nekalibriranih odmernih aplikatorjev (če se uporabljajo).

V kliničnih primerih, pri katerih se sumi na pojav rezistence na antihelmintik, je treba opraviti nadaljne preiskave z uporabo ustreznih testov (npr. test zmanjšanja števila jajčec/FECR test). V primerih, ko rezultati testov kažejo na rezistenco na določen antihelmintik, je treba uporabiti antihelmintik iz drugega farmakološkega razreda z drugačnim načinom delovanja.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Nekaj dni po dajanju zdravila se mora iztrebke zdravljenih živali zbirati in neškodljivo odstranjevati.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Po uporabi si je treba umiti roke.

Brejest in laktacija:

Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.

Nesnost:

Lahko se uporablja v obdobju nesnosti.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Sočasna uporaba piperazinijevega citrata in derivatov fenotiazina ali klorpromazina ni priporočljiva, saj lahko povzroči vzdraženost osrednjega živčnega sistema. Sočasna uporaba levamizola ali pirantela s piperazinijevim citratom lahko antagonistično deluje na nematode.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Ti ukrepi pomagajo varovati okolje.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODIL ZA UPORABO

27.3.2018

15. DRUGE INFORMACIJE

Delovanje

Piperazinijev citrat pri parazitih prepreči nevromuskularni prenos s hiperpolarizacijo živčne membrane, kar vodi do šibke paralize. Prepreči tudi nastajanje sukcinata pri glistah. Gostitelj izloča paralizirane oblike s črevesno peristaltiko. Praviloma zadostuje en odmerek zdravila za odpravo vseh občutljivih vrst parazitov.

Način izdaje zdravila

Na veterinarski recept.

16. VELIKOST PAKIRANJA

50 g
100 g

17. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:{mesec/leto}

18. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI« IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

19. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0260/001

20. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:{serija}