

**A.      NOTICE**

**NOTICE****1. Nom du médicament vétérinaire**

Cardisure 1,25 / 2,5 / 5 / 10 mg comprimés pour chiens

**2. Composition****Substances actives :**

Pimobendane

1,25 mg : Chaque comprimé contient 1,25 mg de pimobendane

2,5 mg : Chaque comprimé contient 2,5 mg de pimobendane

5 mg : Chaque comprimé contient 5 mg de pimobendane

10 mg : Chaque comprimé contient 10 mg de pimobendane

Comprimés ronds de couleur brun clair, portant une encoche sur une face et lisses sur l'autre face.  
Les comprimés peuvent être divisés en 2 (1,25 mg) ou 4 (2,5 mg, 5 mg et 10 mg) parties égales.

**3. Espèces cibles**

Chiens.

**4. Indications d'utilisation**

TraITEMENT de l'insuffisance cardiaque congestive due à une insuffisance valvulaire (régurgitation mitrale et/ou tricuspidienne) ou à une cardiomyopathie dilatée.

**5. Contre-indications**

Ne pas utiliser en cas de cardiomyopathies hypertrophiques ou dans le cas d'états cliniques où l'augmentation du débit cardiaque n'est pas possible pour des raisons fonctionnelles ou anatomiques (par exemple sténose aortique). Voir également la rubrique « Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte ».

**6. Mises en garde particulières****Mises en garde particulières :**

Le médicament vétérinaire doit être administré au moins une heure avant les repas (estomac vide), car l'absorption est réduite en cas d'ingestion simultanée de nourriture.

**Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles :**

Le médicament vétérinaire est aromatisé. Afin d'éviter toute ingestion accidentelle, garder les comprimés hors de portée des chiens.

Une étude *in vitro* sur des tissus de rat a démontré que le pimobendane augmentait la libération d'insuline glucose-dépendante des cellules bêta pancréatiques en fonction de la dose. Si le médicament vétérinaire est administré à des chiens diabétiques, les niveaux de glycémie doivent être surveillés attentivement.

Comme le pimobendane est métabolisé dans le foie, il convient de prendre des précautions suffisantes lors de l'administration du médicament vétérinaire aux chiens atteints d'une insuffisance hépatique sévère.

La surveillance de la fonction et de la morphologie cardiaque est recommandée chez les animaux traités au pimobendane. (Voir également la rubrique « Effets indésirables »).

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Se laver les mains après usage.

Pour le médecin : l'ingestion accidentelle, particulièrement chez les enfants, peut entraîner un épisode de tachycardie, d'hypotension orthostatique, une rougeur de la face et des maux de tête.

Gestation et lactation :

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation ou de lactation.

L'utilisation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable.

Les études de laboratoire sur les rats et les lapins n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes ou foetotoxiques. En revanche, ces études ont mis en évidence des effets maternotoxiques et embryotoxiques à des dosages élevés et ont également montré que le pimobendane est excrété dans le lait.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions :

Des études pharmacologiques n'ont pas détecté d'interaction entre l'ouabaïne, un glycoside cardiotonique, et le pimobendane. L'augmentation de la contractilité du cœur liée au pimobendane est diminuée en présence du vérapamil (inhibiteur calcique) et du propranolol (bêta-bloquant).

Surdosage :

En cas de surdosage, un effet chronotrope positif et des vomissements peuvent survenir. Dans ce cas, il y a lieu de réduire le dosage et d'initier un traitement symptomatique approprié.

En cas d'exposition prolongée (chiens beagles en bonne santé recevant 3 à 5 fois la dose recommandée pendant 6 mois), un épaississement de la valve mitrale et une hypertrophie ventriculaire gauche ont été observés chez certains chiens.

## 7. Effets indésirables

Chiens :

Rare (1 à 10 animaux / 10 000 animaux traités) :	Augmentation de la fréquence cardiaque <sup>a,b</sup> , augmentation de la régurgitation mitrale <sup>c</sup> Vomissements <sup>b</sup> , diarrhée <sup>d</sup> Anorexie (perte d'appétit) <sup>d</sup> , léthargie (manque d'énergie) <sup>d</sup>
Très rare (< 1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) :	Pétéchies sur les muqueuses (petits points rouges sous la peau dus à des saignements) <sup>e</sup> , hémorragie (saignement) sous-cutanée <sup>e</sup>

<sup>a</sup> Effet chronotrope positif modéré.

<sup>b</sup> Effets liés à la dose et pouvant être évités par une réduction de la dose.

<sup>c</sup> Observée durant un traitement chronique au pimobendane chez des chiens atteints d'insuffisance mitrale.

<sup>d</sup> Passagères.

<sup>e</sup> Bien qu'une relation avec le pimobendane n'ait pas été clairement établie, dans de très rares cas des signes d'effets sur l'hémostase primaire ont été observés durant le traitement. Ces symptômes disparaissent à l'arrêt du traitement.

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament. Si vous constatez des effets indésirables, même ceux ne figurant pas sur

cette notice, ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez contacter en premier lieu votre vétérinaire. Vous pouvez également notifier tout effet indésirable au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à son représentant local utilisant les coordonnées figurant à la fin de cette notice, ou par l'intermédiaire de votre système national de notification : [www.notifierunefeffetindesirable-animaux.be/](http://www.notifierunefeffetindesirable-animaux.be/) ou mail: [adversedrugreactions\\_vet@fagg-afmps.be](mailto:adversedrugreactions_vet@fagg-afmps.be)

## **8. Posologie pour chaque espèce, voies et mode d'administration**

Voie orale.

Les comprimés doivent être administrés par voie orale à un dosage de 0,2 mg à 0,6 mg de pimobendane par kg de poids corporel par jour. La dose journalière conseillée est de 0,5 mg de pimobendane par kg de poids corporel. La dose doit être répartie en 2 administrations orales de 0,25 mg/kg, la moitié de la dose le matin et l'autre moitié environ 12 heures plus tard. La dose d'entretien doit être ajustée individuellement en fonction de la gravité de la maladie.

Le médicament vétérinaire peut être associé à un traitement diurétique, comme par exemple le furosémide.

Pour couper un comprimé en deux, poser le comprimé sur une surface plane avec la face marquée vers le haut, tenir une moitié du comprimé et appuyer sur l'autre moitié.



Pour couper en quatre un comprimé à rainure double, le placer sur une surface plane avec la face marquée vers le haut et appliquer une pression au centre avec le pouce.



Chaque dose doit être administrée environ une heure avant le repas.

## **9. Indications nécessaires à une administration correcte**

Le médicament vétérinaire doit être réservé aux chiens atteints d'insuffisance cardiaque.  
Ne pas dépasser la dose recommandée.

Afin de garantir une posologie appropriée, le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible.

## **10. Temps d'attente**

Sans objet.

## **11. Précautions particulières de conservation**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

Remettre les comprimés divisés dans la plaquette thermoformée ouverte et les utiliser dans les 3 jours.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étiquette après Exp. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

## **12. Précautions particulières d'élimination**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Utiliser des dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable. Ces mesures devraient contribuer à protéger l'environnement.

Demandez à votre vétérinaire ou à votre pharmacien comment éliminer les médicaments dont vous n'avez plus besoin.

### **13. Classification des médicaments vétérinaires**

Médicament vétérinaire soumis à ordonnance.

### **14. Numéros d'autorisation de mise sur le marché et présentations**

1.25 mg: BE-V395787 Blister (ALU/PVC/PE/PVDC)  
BE-V395796 Blister (ALU/ALU)

2.5 mg: BE-V395805 Blister (ALU/PVC/PE/PVDC)  
BE-V395814 Blister (ALU/ALU)

5 mg: BE-V395823 Blister (ALU/PVC/PE/PVDC)  
BE-V395832 Blister (ALU/ALU)

10 mg: BE-V395841 Blister (ALU/PVC/PE/PVDC)  
BE-V395857 Blister (ALU/ALU)

#### **Présentations :**

Plaquettes thermoformés Aluminium-PVC/PE/PVDC :  
Boîte de 2/ 5/10/25 plaquettes thermoformées de 10 comprimés.

Plaquettes thermoformés Aluminium-Aluminium:

1,25 mg ou 2,5 mg comprimés : Boîte de 2/ 5/10/25 plaquettes thermoformées de 10 comprimés.  
5 mg ou 10 mg comprimés : Boîte de 4/10/20/50 plaquettes thermoformées de 5 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### **15. Date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois**

Janvier 2026

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données de l'Union sur les médicaments (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

### **16. Coordonnées**

#### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Dechra Regulatory B.V.  
Handelsweg 25, 5531 AE Bladel  
Pays-Bas

#### Fabricant responsable de la libération des lots :

Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25, 5531 AE Bladel  
Pays-Bas

ou

Genera d.d.  
Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica  
10436 Rakov Potok, Croatie  
Coordonnées supplémentaires pour XI:  
Dales Pharmaceuticals Limited  
Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton  
North Yorkshire, BD23 2RW, Royaume-Uni

Représentants locaux et coordonnées pour notifier les effets indésirables présumés :

Dechra Veterinary Products NV  
Atealaan 34  
2200 Herentals  
Belgique  
Tel: +32 14 44 36 70

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

**17. Autres informations**

Dans des cas d'insuffisance valvulaire, il a été prouvé que le médicament vétérinaire utilisé en association avec du furosémide améliorait la qualité de vie et prolongeait l'espérance de vie des chiens traités.

Dans un nombre limité de cas de cardiomyopathie dilatée, il a été prouvé que le médicament vétérinaire utilisé en association avec du furosémide, de l'éналаприл и de la digoxine améliorait la qualité de vie et prolongeait l'espérance de vie des chiens traités.