

PROSPECTO

VIRBAMEC SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL CONTINUA PARA BOVINOS 5 mg/ml Ivermectina

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización y fabricante que libera el lote:

VIRBAC
1ère avenue 2065 m LID
06516 Carros
Francia

Representante del titular:

Virbac España S.A. - Angel Guimerá, 179-181 - 08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona - España.

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VIRBAMEC SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL CONTINUA PARA BOVINOS 5 mg/ml

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Ivermectina..... 0,5 % p/v (5 mg/ml)

4. INDICACIONES DE USO

Virbamec solución para unción dorsal continua está indicado para el tratamiento de vermes redondos gastrointestinales, vermes pulmonares, hipodermosis (barros), sarna coriódica y sarcóptica, piojos chupadores y masticadores en bovinos productores de carne y bovino lechero no lactante.

Vermes redondos gastrointestinales (adultos y estadio larvario L4):

<i>Ostertagia ostertagi</i>	(estadio larvario L4, adultos y estadios inhibidos)
<i>Haemonchus placei</i>	(estadio larvario L4, adultos)
<i>Trichostrongylus axei</i>	(estadio larvario L4, adultos)
<i>Trichostrongylus colubriformis</i>	(estadio larvario L4, adultos)
<i>Cooperia</i> spp.	(adultos)
<i>Cooperia punctata</i>	(adultos)
<i>Cooperia oncophora</i>	(adultos)
<i>Oesophagostomum radiatum</i>	(estadio larvario L4, adultos)
<i>Strongyloides papillosus</i>	(adultos)
<i>Trichuris</i> spp.	(adultos)

Vermes pulmonares (adultos y estadio larvario L4):

Dictyocaulus viviparus



Hipodermosis o barro (estadios parasitarios):

Hypoderma bovis
Hypoderma lineatum

Ácaros:

Sarcoptes scabiei var. *bovis*
Chorioptes bovis

Piojos:

Piojos chupadores
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus

Piojos masticadores
Damalinia bovis

Virbamec solución para unción dorsal continua aplicado al nivel de dosis recomendado de 500 mcg de ivermectina por kg de peso vivo tiene una actividad persistente sobre:

<i>Dictyocaulus viviparus:</i>	hasta 28 días
<i>Ostertagia</i> spp.:	hasta 21 días
<i>Oesophagostomum radiatum:</i>	hasta 21 días
<i>Cooperia</i> spp.:	hasta 14 días
<i>Trichostrongylus axei:</i>	hasta 14 días

Virbamec solución para unción dorsal continua ayuda en el control de los ácaros *Chorioptes bovis* pero es posible que no se produzca una eliminación completa.

Virbamec solución para unción dorsal continua también tiene una actividad persistente contra las moscas de los cuernos (*Haematobia irritans*) hasta 28 días, una eficacia parcial puede permanecer hasta 35 días después del tratamiento.

Ocasionalmente se puede observar una actividad variable contra *Haemonchus placei* (L4), *Cooperia* spp., *Trichostrongylus axei* y *Trichostrongylus colubriformis*.

Para obtener un beneficio óptimo del Virbamec solución para unción dorsal continua, se recomienda utilizar el medicamento como parte de un programa de tratamiento en función de los datos epidemiológicos de los parásitos en cuestión.

5. CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente.

Este medicamento es únicamente para aplicación en la superficie de la piel, no inyectar o administrar por vía oral.

No administrar a vacas lecheras en lactación ni siquiera durante el período de secado, ni a vacas productoras de carne en lactación, cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No utilizar en vacas en gestación en los 60 días previos al parto.



6. REACCIONES ADVERSAS

Ninguna conocida.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

7. ESPECIES DE DESTINO

Bovino.

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Posología

1 ml por 10 kg de peso vivo (basado en la dosis recomendada de 500 mcg de ivermectina por kg de peso vivo).

Métodos de administración

Unción dorsal continua.

Para asegurar la administración de la dosis correcta, se determinará el peso vivo de la manera más precisa posible, y deberá ser revisada la precisión del dosificador.

El medicamento debe ser aplicado al lo largo de la línea dorsal en una banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta al nacimiento de la cola.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

- Frascos de 500 ml y 1 litro de Virbamec solución para unción dorsal continua:

Los dos frascos están equipados de una copa dosificadora.

Enroscar firmemente la copa dosificadora en el frasco.

Para fijar la dosis, girar la parte superior de la copa hasta que coincida con el peso vivo del animal a tratar. Cuando el peso vivo se encuentre entre dos marcas, usar la más alta.

Poner el frasco en posición vertical hacia arriba, luego presionarlo ligeramente hasta que el líquido exceda ligeramente la marca, como indican las líneas de calibrado.

Al ceder la presión sobre el frasco, la dosis se ajusta automáticamente al nivel correcto. Inclinar el frasco y dispensar la solución.

Importante – Poner el frasco en posición vertical durante el llenado de la copa dosificadora y durante el almacenamiento.

Cerrar el recipiente cuando no se utiliza. Almacenar en posición vertical.

- Bidones de 2,5 litros y 5 litros

Estos recipientes están equipados con correas y de una tapa.

Tienen que ser utilizados con un sistema de dosificación adecuado.

Conectar el sistema de dosificación al bidón como se indica.

Conectar la extremidad abierta del tubo al sistema de dosificación.

Fijar firmemente la otra extremidad con el muelle a la contera del bidón, tras haber quitado el tapón de transporte.

Cebad despacio el sistema de dosificación, asegurándose que no hay escape.

Seguir las instrucciones del fabricante sobre el modo de uso y la manutención del sistema de dosificación.



10. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO EN ANIMALES

No aplicar en zonas de la piel con costras de sarna u otras lesiones o zonas contaminadas con barro o estiércol.

Las vacas no deberían tratarse cuando el pelo o la piel están mojados. La lluvia puede reducir la eficacia cuando cae sobre los animales tratados en las primeras dos horas tras la administración. No obstante, la eficacia del medicamento frente a infecciones establecidas por *Ostertagia ostertagi* o *Dictyocaulus viviparus* no se ve afectada adversamente si la piel está mojada o llueve justo después del tratamiento. No se conoce la influencia de condiciones climáticas extremas en la eficacia a largo plazo (persistencia de la actividad) del Virbamec solución para unción dorsal continua.

Las avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no esté autorizado el medicamento (se han observado casos graves de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas).

Puede presentarse resistencias si su uso es frecuente y repetido.

El medicamento es eficaz en todos los estadios de hipodermosis, sin embargo es muy importante tratar a tiempo (al final de la época de vuelo de la mosca). La eliminación de la larva de *Hypoderma* cuando se encuentra en zonas vitales puede provocar efectos adversos en el animal. Matar *Hypoderma lineatum* cuando se encuentra en los tejidos periesofágicos, puede provocar salivación y timpanismo. Matar *Hypoderma bovis* cuando se encuentra en el conducto vertebral puede provocar temblores o parálisis. Los bovinos tienen que ser tratados antes o después de estos estadios de las larvas de las moscas.

11. TIEMPO DE ESPERA

Carne: 28 días.

No usar en vacas en lactación cuya la leche se utiliza para el consumo humano. No usar en vacas en gestación, cuya leche se utiliza para el consumo humano, durante los 60 días previos al parto.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Muy inflamable – No fumar. Mantener alejado del calor, de chispas, llamas u otras fuentes de ignición.

Conservar el medicamento en el envase original y perfectamente cerrado.

Mantener el envase en el embalaje exterior para protegerlo de la luz.

Almacenar el embalaje en posición vertical.

Temperatura de conservación: ninguna.

Puede producirse un enturbamiento cuando Virbamec solución para unción dorsal continua se almacena por debajo de 0 °C. Dejando alcanzar la temperatura ambiente se reestablecerá el aspecto normal sin afectar la eficacia.

13. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Se deben evitar las siguientes prácticas puesto que incrementan el riesgo e desarrollo de resistencia y que en último caso, la terapia resulte ineficaz:

- El uso frecuente y repetido de los antihelmínticos de una misma clase o durante un extenso periodo de tiempo.
- La infradosificación, que puede ser debida a una estimación incorrecta del peso vivo, mal uso del medicamento o falta de calibración del aparato dosificador.



Ante la sospecha de casos clínicos en los que se aprecie resistencia a un determinado antihelmíntico o antihelmínticos se debe investigar este hecho mediante los oportunos ensayos, (p.ej. test de reducción del recuento de huevos en heces). Cuando los resultados indiquen de forma clara la resistencia a un antihelmíntico en particular, se debe administrar un antihelmíntico de otro grupo farmacológico o con un mecanismo de acción diferente.

Se ha notificado resistencia a la ivermectina (una avermectina) de *Cooperia oncophora* en bovino en la UE, de *Teladorsagia* en bovino en países desarrollados como Nueva Zelanda y de *Haemonchus* en bovino fuera de la UE. Por tanto, el uso de este medicamento deberá basarse en la información epidemiológica local (regional o de la propia granja) acerca de la susceptibilidad de estas especies de nematodos y las recomendaciones sobre como limitar una selección adicional de resistencia frente a antihelmínticos.

Virbamec solución para unción dorsal continua puede ser irritante para la piel y los ojos de las personas y el usuario debe tener cuidado de no derramar el medicamento sobre sí mismo o sobre otras personas. Los operarios deben llevar guantes de nitrilo, botas de goma e impermeable cuando apliquen el medicamento. La ropa protectora debe lavarse después de su uso.

Si hay contacto accidental con la piel, lavar inmediatamente el área afectada con agua y jabón. Si ocurre una exposición accidental sobre los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y acudir al médico.

No fumar o comer durante la manipulación del medicamento.

Lavarse las manos después de su uso.

Usar solamente en áreas bien ventiladas o al aire libre.

MUY INFLAMABLE.

14. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normativa vigente.

La ivermectina es EXTREMADAMENTE PELIGROSA PARA LOS PECES Y LA VIDA ACUÁTICA. El animal tratado no debe tener acceso directo a aguas superficiales ni a corrientes de agua. No contaminar las aguas superficiales ni las corrientes de agua con el medicamento o el envase usado.

15. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Enero 2017

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.