

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Stresnil 40 mg/ml инжекционен разтвор за свине

2. Състав

Всеки ml съдържа:

Активно вещество:

Azaperone 40 mg

Стерилен, бистър, бледожълт воден разтвор.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Свине.

4. Показания за употреба

Stresnil е предназначен за:

Контрол на агресивността

- профилактика и контрол на агресивността след прегрупиране;
- контрол на агресивността при свинете майки към новородените.

За приложение при различни, свързани със стрес случаи

- претоварване на сърцето;
- транспортен стрес.

В случаи на акушерска намеса

- превъзбуденост по време на раждане;
- като помощно средство (акуширано раждане, израждане с помощта на форцепс);
- по време на коригиране на изпаднала матка;
- при много силни контракции.

За премедикация при локална или обща анестезия

- подготовка за основната анестезия.

5. Противопоказания

Да не се използва при транспорт и прегрупиране на прасета, предназначени за клане до 18 дни след използването му, поради възможни остатъчни количества.

Да не се използва при много ниски температури, поради възможен риск от кардиоваскуларен колапс, дължащ се на периферна вазодилатация.

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

При инжектиране на големи животни с къса игла във врата има риск от попадане на част от продукта в сланината. В такъв случай приложението ще има непълен ефект.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Stresnil, както и другите бутирофенони, могат да действат седативно и на човека, прилагащ продукта. При прилагане на продукта трябва да се вземат всички необходими мерки, за да се избегне самоинжектиране.

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Хора с установена свръхчувствителност към azaperone трябва да прилагат ветеринарния лекарствен продукт с повишено внимание.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Когато се използва в комбинация с други инжективни продукти, трябва да се избягва смесването им в една спринцовка.

Предозиране:

При високи дози могат да се появят слюноотделяне и учестено дишане. Тези неблагоприятни реакции изчезват спонтанно и не причиняват трайни увреждания. При нерези дозата от 1 mg/kg не трябва да се надвишава. При нерезите свръх дозата може да доведе до отпускане на пениса, което да причини нараняването му.

Тъй като ефектът от продукта е тясно свързан с посочената доза, Stresnil може да доведе до всички степени на седативност - от успокоение след стрес до “нокдаун” ефект.

Основни несъвместимости:

Не са известни.

7. Неблагоприятни реакции

Свине:

Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения):
Хиперсаливация
Диспнея

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен

продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: {подробности за националната система}.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Начин на приложение: i.m. (интрамускулно приложение).

Агресивност

Превенция и контрол на агресивността след прегрупиране:

Доза: 2 mg/kg (1 ml/20 kg)

Превенция на агресивността

Прасета от различни прасила или боксове могат да бъдат поставени заедно на едно място, веднага след инжектиране със Stresnil. Само няколко минути след приложението му животните, независимо от техния произход, лягат заедно в помещението за около 2 часа. След като действието на Stresnil отmine, яростните боеве са рядкост или изобщо не се наблюдават. Всички животни в групата трябва да бъдат третирани, като се спазва посочената доза.

Ако дозата е прекалено ниска, животните ще бъдат спокойни, но агресията ще бъде обуздана само временно или въобще няма да бъде овладяна. Ако дозите са прекалено високи, опасни боеве могат да възникнат веднага след събуждането на животните.

В деня на третирането, на все още нетретираните животни не трябва да се позволява да тичат. На отбитите прасенца може да се приложи Stresnil при настаняване в помещенията за уговяване.

Контрол на агресивността

Биещите се животни стават спокойни сравнително бързо след инжектиране със Stresnil. Малко вероятно е животните да се бият, дори и след като ефектът му намалее и изчезне. Некастрираните нерези е възможно да останат агресивни и след събуждане.

Контрол на агресивността при свине майки към новородените:

Доза: 2 mg/kg (1 ml/20 kg)

Свиня майка, която не приема новородените прасенца или ги хапе, ги приема от ½ до 1 час след третиране със Stresnil. При инжектирането тя трябва да бъде доближена много внимателно, за да не бъде стресирана. Препоръчаната доза трябва да се прилага стриктно. Много ниската доза води само до временно успокояване на животното. Ако дозата е много висока, агресивността може отново да се прояви веднага след като действието на Stresnil премине.

Стрес

Претоварване на сърцето (внезапна сърдечна смърт):

Доза: 0,4 mg/kg (1 ml/100 kg)

Животните се успокояват няколко минути след приложението. Треперенето намалява и дишането се успокоява. Цианозата изчезва постепенно и пулсът се нормализира. В случаи на незадоволителни резултати, може да се постави втора доза след 15 минути. Много е важно животните да се третират незабавно след появата на първите клинични признаци (напр. учестяване на дишането).

Транспортиране

Транспортиране на отбити прасета:

Доза: 0,4 mg/kg до 2 mg/kg (1 ml/100 kg до 1 ml/20 kg)

Доза от 0,4 mg/kg, инжектирана 15 до 30 минути преди транспортирането, намалява значително смъртността и загубата на тегло по време на транспортирането. Дозата може да бъде увеличена до 2 mg/kg, за да се предотвратят боевете между животните по време на транспортиране.

Животните трябва да имат достатъчно пространство за лежане и камионът трябва да се вентилира. Животните остават сънливи за около 2 до 3 часа след инжектирането.

Транспортиране на нерези:

Доза: 1 mg/kg (0,5 ml/20 kg)

Животните трябва да се инжектират 15 до 30 минути преди транспортиране. Те трябва да се държат отделени, в спокойна среда по време на действието на продукта. Животните остават сънливи за около 2 – 3 часа след приложението. Стриктно спазвайте указаната доза от 1 mg/kg. Да не се предозира!

Предозирането може да доведе до отпускане на пениса, което да причини нараняването му.

При акушерска намеса:

Доза: 2 mg/kg (1 ml/20 kg)

Прекъсване на родилния процес поради превъзбуда.

Като помощно средство при акуширано раждане и израждане с помощта на форцепс.

При корекция на изпадане на вагината и матката.

При много силни контракции.

Премедикация за анестезия:

Доза: 1 до 2 mg/kg i.m. (0,5 до 1 ml/20 kg)

Комбинацията на Stresnil с приспивателни средства води до състояние на обща анестезия, което позволява извършването на почти всички хирургически процедури – диагностично изследване, кастрация, крипторхизъм, ингвинална или пъпна херния, изпадане на ректума и цезарово сечение.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

При всички показания Stresnil се инжектира строго интрамускулно, в областта на врата, зад ухото. Трябва да се използва дълга хиподермална игла и да се инжектира възможно най-близо до ухото, перпендикулярно на повърхността на кожата.

След приложение, животните трябва да бъдат оставени сами в спокойна обстановка по време на индукционния период. Незадоволителни резултати могат да се очакват, ако по време на индукционния период животните бъдат обезпокоявани.

За да се гарантира правилна дозировка, телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.

Не прилагайте повече от 5 ml в едно място на инжектиране.

10. Карентни срокове

Месо и вътрешни органи: 18 дни.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да не се съхранява при температура над 25 °C.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен флакона след Exp. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 28 дни.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-2110

Флакони от 100 ml.

15. Дата на последната редакция на текста

10/2024

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Германия

Тел: +48221047815

PV.BGR@elancoah.com

Производител, отговарящ за освобождаването на партиди:

Elanco France S.A.S.

26 Rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Франция

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП