

APILIFE VAR trak za čebeljo družino za medonosne čebele

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

CHEMICALS LAIF S.P.A.

V.le dell'Artigianato n° 13

35010 Vigonza (PD), Italija

tel. (049) 626281 - faks (049) 628501 - e-pošta: info@chemicalslaif.it

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:

CHEMICALS LAIF S.P.A.

Via Roma n° 69, 36020 Castegnero (VI), Italija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

APILIFE VAR trak za čebeljo družino za medonosne čebele

3. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN

En trak za čebeljo družino vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

timol 8,00 g;

eterično olje evkalipta 1,72 g;

kafra, racemna 0,39 g;

levomentol 0,39 g;

4. INDIKACIJA(E)

Zdravljenje varoze, ki jo povzroča *Varroa destructor*

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte med čebeljo pašo, da se prepeči možen pojav priokusa v medu.

Ne uporabljajte, kadar najvišja dnevna temperatura presega 30°C.

6. NEŽELENI UČINKI

Možno je, da čebele premaknejo hrano, ki se nahaja pod trakom.

Uporaba zdravila pri temperaturah, ki presegajo 30°C, lahko poveča stres in smrtnost odraslih čebel in zalege.

Možno je, da je čebelja družina v obdobju zdravljenja rahlo vznemirjena.

Če čebele med zdravljenjem krmimo, se lahko opazi manjša poraba krmila.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Medonosne čebele (*Apis mellifera*)

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Odmerjanje: 1 trak na vsakih 7 dni za vsak panj; za celoten postopek zdravljenja 4 trakovi za vsak panj. Zdravljenje je treba opraviti enkrat letno.

Način dajanja zdravila: iz vrečke potegnite en trak in ga namestite v enega izmed štirih kotov nad panjem, proč od zalege, ki se nahaja v središču panja. Panj znova pokrijte in pustite, da zdravilo deluje 7 dni. Zdravilo se lahko uporablja tudi v AŽ panju.

Trak lahko uporabite tudi tako, da ga razrežete na 3-4 manjše kose in jih namestite v kote panja. Ta postopek ponovite štirikrat zapored. Ob koncu zdravljenja odstranite morebitne ostanke.

Uporaba zdravila v panjih z več nakladami ni priporočljiva; verjetno je, da učinkovitost zdravila ne bi bila zadostna.

Načrt celovitega zdravljenja

Učinek zdravila se lahko med čebeljimi družinami razlikuje zaradi neenakih okoljskih dejavnikov (okoljski dejavniki povezani s krajem in podnebnimi razmerami, temperatura, genetika in stopnja naselitve škodljivih organizmov, ponovna naselitev, populacija čebel, odpornost panja, zalege in umrljivost čebel itd.). To zdravilo naj bi se zato uporabljalo kot eno od zdravil pri načrtu integriranega zatiranja škodljivcev. Pri tem je potrebno redno spremljati padec pršic. Če je v obdobju 14 dni od zaključka zdravljenja z zadevnim zdravilom povprečen padec pršic za posamezno družino več kot ena na dan, je potrebno to družino ponovno izpostaviti dodatnemu zimskemu ali spomladanskemu zatiranju varoze (po možnosti z drugo zdravilno učinkovino).

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Navedba ni smiselna.

10. KARENCA

Med: 0 dni

Ne uporabljajte med čebeljo pašo, da se prepeči možen pojav priokusa v medu.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo

Zdravilo ne sme zmrzniti

Shranjujte v originalni ovojnini

12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Uporaba zdravila pri temperaturah, ki presegajo 30°C, lahko poveča stres in smrtnost odraslih čebel in zalege.

Za večjo učinkovitost zdravljenja uporabite zdravilo proti koncu poletja, po odvzemu medu, ko je zalega manjša.

Idealna zunanja temperatura za učinkovitost zdravila med postopkom zdravljenja je med 20 in 25°C.

Zdravilo ni dovolj učinkovito, če je povprečna zunanja temperatura pod 15°C.

Zdravljenje naj poteka ob odsotnosti satov. Zdravila ne uporabljajte med čebeljo pašo, ampak po odvzemu medu.

V izogib ropanju, moramo vse čebelje družine v istem čebelnjaku zdraviti istočasno.

Izogibajte se motenju panja. Traku ne nameščajte na sredini panja ali v bližini zalege.

Ne postavite traka blizu krmilnika sladkorja, ker se lahko zmanjša obseg hranjenja.

V hladnih obdobjih uporaba ni priporočljiva.

Izogibajte se stiku zdravila s kožo in očmi. Pri stiku s kožo in očmi lahko povzroča kontaktni dermatitis in draženje, ki je bil opažen pri uporabi timola.

Pri rokovanju z zdravilom mora čebelar uporabljati nepremočljive rokavice in običajna zaščitna sredstva.

Po namestitvi traku si roke in predmete, ki so bili v stiku s trakom, umijte z milnico in vodo.

V primeru stika s kožo kontaminirano mesto temeljito sperite z milnico in vodo.

V primeru stika z očmi temeljito sperite oči z velikimi količinami čiste tekoče vode in poiščite zdravniško pomoč. Ne vdihavajte.

Ne uporabljajte sočasno z drugimi akaricidi.

V primeru prekomernega odmerjanja, kar pomeni namestitev večjega števila trakov od predpisanega, zdravilo lahko povzroči motnje pri čebelah, poveča njihovo vznemirjenost in jih vodi k spremembam vedenja v obliki njihovega zapuščanja panja in zadrževanja zunaj njega.

Če najdete mrtve čebele ali ličinke, odstranite trakove, ki presegajo priporočeni odmerki.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

APILIFE VAR ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevaren za ribe in druge vodne organizme.

14. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Brez Rp-Vet.

15. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

16. DRUGE INFORMACIJE

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka: {številka}

18. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: vsi trakovi v odprti vrečki morajo biti takoj uporabljeni.

Številka dovoljenja za promet:

MR/V/0406/001

Velikost pakiranja: Vrečka vsebuje dva trakova.