

ЛИСТОВКА:

ТЕТРАНЕОМАСТ Ф - интрамамарна суспензия за крави в лактационен период

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:

“Фарма Вет” ООД,
гр. Шумен, ул. ”Отец Паисий” № 40,
България
тел./факс: 054 801215
E-mail: farma_vet@abv.bg

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ТЕТРАНЕОМАСТ Ф
TETRANEOMAST F

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции в 8 g:

| | |
|----------------------|--------|
| Tetracycline HCl | 200 mg |
| Neomycin sulfate | 250 mg |
| Prednisolone acetate | 10 mg |

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на клинични и субклинични мастити, причинени от чувствителни към комбинацията микроорганизми (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* и *Escherichia coli*) при крави в лактационен период.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда (крави в лактационен период).

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Съдържанието на една интрамамарна спринцовка от 8 g се впръсква в засегнатата четвъртина през 12-часов интервал за 4 последователни издоявания.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди приложението на продукта трябва да се извърши пълно издождане на млечната жлеза. Млечните папили на четвъртините, които ще бъдат третирани трябва внимателно да бъдат почистени и дезинфекцирани с почистваща кърпа.

След отстраняване на върха на капачката в папилата на млечната жлеза внимателно се въвежда накрайника на шприца.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи: 14 дни.

Мляко: 5 дни (10 издождания).

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Употребата на продукта трябва да се базира на изследване за чувствителност на изолираните от животното бактерии. Ако това не е възможно, терапията трябва да се базира на местната (регионална, на ниво ферма) епидемиологична информация за чувствителността на прицелните бактерии. Когато се използва продуктът, трябва да се вземе предвид официалната и местна антимикуробна политика.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към тетрациклин и неомицин трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.

Лактация:

Може да се прилага по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не е известно.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

01/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР