

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

APILIFE VAR trak za čebeljo družino za medonosne čebele

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

En trak za čebeljo družino vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

timol	8,00 g
eterično olje evkalipta	1,72 g
kafra, racemna	0,39 g
levomentol	0,39 g

Za celoten seznam pomožnih snovi, glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Trak za čebeljo družino .

Zelena gobica velikosti okrog 7,5 x 5,0 x 0,5 cm, napojena z eteričnimi olji

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Ciljne živalske vrste

Medonosne čebele (*Apis mellifera*)

4.2 Indikacije za uporabo pri ciljnih živalskih vrstah

Zdravljenje varoze, ki jo povzroča *Varroa destructor*

4.3 Kontraindikacije

Ne uporabljajte med čebeljo pašo, da se prepeči možen pojav priokusa v medu.

Ne uporabljajte, kadar najvišja dnevna temperatura presega 30°C.

4.4. Posebna opozorila

Uporaba zdravila pri temperaturah, ki presegajo 30°C, lahko poveča stres in smrtnost odraslih čebel in zalege.

Za večjo učinkovitost zdravljenja uporabite zdravilo proti koncu poletja, po odvzemu medu, ko je zalega manjša.

Idealna zunanja temperatura za učinkovitost zdravila med postopkom zdravljenja je med 20 in 25°C.

Zdravilo ni dovolj učinkovito, če je povprečna zunanja temperatura pod 15°C.

4.5 Posebni previdnostni ukrepi

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Zdravljenje naj poteka ob odsotnosti satov. Zdravila ne uporabljajte med čebeljo pašo , ampak po odvzemu medu.

V izogib ropanju, moramo vse čebelje družine v istem čebelnjaku zdraviti istočasno.

Izogibajte se motenju panja. Traku ne nameščajte na sredini panja ali v bližini zalege.

Ne postavite traka blizu krmilnika sladkorja, ker se lahko zmanjša obseg hranjenja.

V hladnih obdobjih uporaba ni priporočljiva.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Izogibajte se stiku zdravila s kožo in očmi. Pri stiku s kožo in očmi lahko povzroča kontaktni dermatitis in draženje, ki je bil opažen pri uporabi timola.

Pri rokovanju z zdravilom mora čebelar uporabljati nepremočljive rokavice in običajna zaščitna sredstva.

Po namestitvi traku si roke in predmete, ki so bili v stiku s trakom, umijte z milnico in vodo.

V primeru stika s kožo kontaminirano mesto temeljito sperite z milnico in vodo.

V primeru stika z očmi temeljito sperite oči z velikimi količinami čiste tekoče vode in poiščite zdravniško pomoč. Ne vdihavajte.

4.6. Neželeni učinki (pogostost in resnost)

Možno je, da čebele premaknejo hrano, ki se nahaja pod trakom.

Uporaba zdravila pri temperaturah, ki presegajo 30°C, lahko poveča stres in smrtnost odraslih čebel in zalege.

Možno je, da je čebelja družina v obdobju zdravljenja rahlo vznemirjena.

Če čebele med zdravljenjem krmimo, se lahko opazi manjša poraba krmila.

4.7. Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti

Navedba ni smiselna.

4.8 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Ne uporabljajte sočasno z drugimi akaricidi.

4.9 Odmerjanje in pot uporabe

Odmerjanje: 1 trak na vsakih 7 dni za vsak panj; za celoten postopek zdravljenja 4 trakovi za vsak panj. Zdravljenje je treba opraviti enkrat letno.

Način dajanja zdravila: iz vrečke potegnite en trak in ga namestite v enega izmed štirih kotov nad panjem, proč od zalege, ki se nahaja v središču panja. Panj znova pokrijte in pustite, da zdravilo deluje 7 dni. Zdravilo se lahko uporablja tudi v AŽ panju.

Trak lahko uporabite tudi tako, da ga razrežete na 3-4 manjše kose in jih namestite v kote panja (glej Slike 1, 2, 3 in 4). Ta postopek ponovite štirikrat zapored. Ob koncu zdravljenja odstranite morebitne ostanke.


Uporaba zdravila v panjih z več nakladami ni priporočljiva; verjetno je, da učinkovitost zdravila ne bi bila zadostna.



Slika 1 Odprite vrečko, ki vsebuje dva trakova.



Slika 2 Vzemite enega izmed trakov in ga razdelite na 3-4 kose



Slika 3 Odprite panj in posamezne kose namestite v kote nad satovi.



Slika 4 Panj znova pokrijte in pustite, da zdravilo deluje 7 dni. Ta postopek opravite štirikrat s svežimi trakovi in ob koncu vsakega cikla odstranite morebitne ostanke trakov.

Načrt celovitega zdravljenja

Učinek zdravila se lahko med čebeljimi družinami razlikuje zaradi neenakih okoljskih dejavnikov (okoljski dejavniki povezani s krajem in podnebnimi razmerami, temperatura, genetika in stopnja naselitve škodljivih organizmov, ponovna naselitev, populacija čebel, odpornost panja, zalege in umrljivost čebel itd.). To zdravilo naj bi se zato uporabljalo kot eno od zdravil pri načrtu integriranega zatiranja škodljivcev. Pri tem je potrebno redno spremljati padec pršic. Če je v obdobju 14 dni od zaključka zdravljenja z zadevnim zdravilom povprečen padec pršic za posamezno družino več kot ena na dan, je potrebno to družino ponovno izpostaviti dodatnemu zimskemu ali spomladanskemu zatiranju varoze (po možnosti z drugo zdravilno učinkovino).

4.10 Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi) (če je potrebno)

V primeru prekomernega odmerjanja, kar pomeni namestitve večjega števila trakov od predpisanega, zdravilo lahko povzroči motnje pri čebelah, poveča njihovo vznemirjenost in jih vodi k spremembam vedenja v obliki njihovega zapuščanja panja in zadrževanja zunaj njega.

Če najdete mrtve čebele ali ličinke, odstranite trakove, ki presegajo priporočeni odmerek.

4.11 Karenca

Med: 0 dni

Ne uporabljajte med čebeljo pašo, da se prepeči možen pojav priokusa v medu.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

Farmakoterapevtska skupina:

Oznaka ATC vet : QP53AX30 (kombinacija drugih ektoparaziticidov za topikalno uporabo)

5.1 Farmakodinamične lastnosti

APILIFE VAR je sestavljen iz mešanice eteričnih olj (timol, kafra, racemna, levomentol in eterično olje evkalipta), v kateri je poglavitna sestavina timol. Ta mešanica eteričnih olj izhlapeva v notranje ozračje zdravljenega panja v odvisnosti od temperature. Ta mešanica hlapov se sprošča v notranjost panja.

Način njihovega delovanja ni znan. Skoraj gotovo je, da delujejo neposredno na pršice, na način vdihavanja in stika. Učinki, ki ga ima zdravilo na pršice, ne delujejo na čebele.

5.2 Farmakokinetični podatki

Farmakokinetika zdravilnih učinkovin zdravila APILIFE VAR v čebelah ni znana.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1. Seznam pomožnih snovi

Ekspandirana fenolna smola (5 cm x 7,5 cm x 0,5 cm)

6.2 Inkompatibilnosti

Ni smiselno.

6.3 Rok uporabnosti

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo: 2 leti.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: vsi trakovi v odprti vrečki morajo biti takoj uporabljeni.

6.4. Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo

Zdravilo ne sme zmrzniti

Shranjujte v originalni obojnini

6.5 Vrsta obojnine in vsebina

Vrečka, sestavljena iz spojenih listov folije iz poliestra/papirja-polietilena/aluminija/polipropilena, vsebuje dva trakova, ki tehtata vsak približno 11 g.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje neuporabljenega zdravila ali odpadnih snovi

Vsako neuporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

APILIFE VAR ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevaren za ribe in druge vodne organizme.

7. IMETNIK(I) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

CHEMICALS LAIF S.P.A.

V.le dell'Artigianato 13, 35010 Vigonza (PD), Italija
tel. (049) 626281
faks (049) 628501
e-pošta: info@chemicalslaif.it

8. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET
MR/V/0406/001

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET
Datum pridobitve dovoljenja: 01. 01. 2001
Datum podaljšanja dovoljenja: 16. 09. 2005

10. DATUM REVIZIJE BESEDILA
16.9.2014

PREPOVED PRODAJE, OSKRBE IN/ALI UPORABE
Ni smiselno.