

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/10/0032

Tabic V.H. putojošās tabletes ūdens šķīduma pagatavošanai vistām un tītariem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) Sp. z o.o.

ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

Polija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Synoptis Industrial Sp. z o.o.

Ul. Rabowicka 15

Swarzedz

Wielkopolskie

62-020

Polija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Tabic V.H. putojošās tabletes ūdens šķīduma pagatavošanai vistām un tītariem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena vakcīnas deva satur:

Aktīvā viela:

Lentogēnais Ņūkāsļas vīruss, celms V.H. $\geq 10^{6,0}$ EID*₅₀

*50% embrijus inficējošā deva.

Gandrīz baltas, apaļas putojošās tabletes.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Vistu un tītaru aktīvai imunizācijai pret Ņūkāsļas slimību.

Imunitātes iestāšanās: 2 nedēļas pēc vakcinācijas.

Imunitātes ilgums: 2 mēneši.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav novērotas.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Vistas (broileri, vaislas putni, dējējvistas) un tītari.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai ar dzeramo ūdeni, intraokulārai lietošanai (iepilīnot acī), lietošanai ar rupjo izsmidzināšanas metodi vai aerosolu.

Lai iegūtu labus rezultātus un nodrošinātu pilnīgu putnu aizsardzību visā to audzēšanas laikā līdz pat nokaušanai (7.-8. ned.), kā arī vaislas un dējējputniem olu dēšanas periodā, cāļus vakcinēt divas reizes: 1. un 17. dzīves dienā.

Sagatavojot suspensiju vakcinācijai, tablete jāizņem no iepakojuma un jāieliek vēsā, vārītā ūdenī. Jāpārlicinās, ka tablete ir pilnībā izšķīdusi, nogaidot 1-2 min. Pēc tam lēni jāsamaisa, lai nodrošinātu vakcīnas viendabīgumu.

Ieteicamie atšķaidīšanas tilpumi (ml):

Devu skaits	Rupjā izsmidzināšana*	Aerosols *	Iepilīnot acīs**
100			
500			
1000	50-300	100-150	30-50
2000	100-600	200-300	60-100
2500	125-750	250-375	75-125
5000	250-1500	500-750	150-250
10000	500-3000	1000-1500	300-500

*Precīzs ūdens daudzums (ml) ir atkarīgs no izmantojamās ierīces izvades: izsmidzināšana ar rupjo izsmidzināšanas metodi vai aerosolu.

** Precīzs ūdens daudzums ir atkarīgs no pipetes tipa.

Vakcinācija ar dzeramo ūdeni

Lietojot vakcīnu ar dzeramo ūdeni, ieteicams nepieciešamo tablešu skaitu izšķīdināt 1/5 no ūdens daudzuma, kuru putni parasti izdzer vienas dienas laikā (precīzs ūdens daudzums atkarīgs no putnu sugas, vecuma un laika apstākļiem). Lai neitralizētu hloru dzeramajā ūdenī, jālieto komerciālais hlora neitralizētājs saskaņā ar instrukciju vai jāpievieno 50 ml vājpiena vai 5 g vājpiena pulvera uz 1 l ūdens. Pēc vājpiena pievienošanas ūdenim, nogaidīt 5 minūtes un tad ielikt vakcīnas tabletes.

NORĀDĪJUMI:

1. Ieteicams vakcinēt putnus no rīta, lietojot vēsu ūdeni.
2. Jānodrošina pietiekams skaits dzirdinātavu, lai visi putni varētu saņemt ūdeni vienlaicīgi un izdzerētu ūdeni ar vakcīnu 2-3 stundu laikā.
3. Ūdenim un dzirdinātāvām ir jābūt tīrām, tajās nedrīkst būt dezinfekcijas līdzekļa palieku.
4. 2 stundas pirms vakcinācijas jāpārtrauc ūdens padeve.
5. Neatsākt ūdens padevi putniem, līdz visa vakcīna nav uzņemta. (1 tableti ar 100, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 vai 10 000 devām izšķīdināt piektdaļā no ūdens daudzuma, ko putni parasti izdzer dienas laikā).

Vakcinācija iepilīnot acīs (intraokulārai lietošanai)

Tabletes jāizšķīdina vēsā, vārītā ūdenī šādā attiecībā: 1 tableti (1000 devas) izšķīdināt 30-50 ml ūdens (precīzs ūdens daudzums ir atkarīgs no pilināšanas ierīces veida).

Rūpīgi saskalināt flakonu pirms vakcinācijas. Ar pipeti putnam jāiepilina acī 1 pilienš vakcīnas.

Vakcinācija ar rupjo izsmidzināšanas metodi un ar aerosolu

Rupjās izsmidzināšanas metode: izsmidzinātājus, kurus visbiežāk lieto dārzniecībā, var lietot vakcīnas izsmidzināšanai vienu dienu veciem cāļiem uzreiz pēc izšķilšanās vai inkubatorā. Vecāku putnu vakcinācijai nepieciešams lietot elektriskos vai uz muguras nēsājamus izsmidzinātājus, kas vienmērīgi izsmidzina; pilieni nedrīkst būt mazāki par 100 µm.

Katram lietojamam izsmidzinātājam ir jābūt pārbaudītam, cik ilgā laikā tiek izsmidzināts ieteicamais ūdens daudzums.

Aerosols: šis lietošanas veids nav ieteicams putniem līdz 2 nedēļu vecumam; tas ir piemērots tikai otrai vakcinācijas reizei.

Elektriskajam vai uz muguras nēsājamam izsmidzinātājam jāveido 40-100 µm lieli pilieni.

NORĀDĪJUMI:

1. Pirms vakcinācijas jāpārbauda vakcinēšanas ierīču izsmidzināšanai vai aerosolam efektivitāte.
2. Smidzināšanas un aerosola sistēmām jābūt izvietotām 60-70 cm augstumā virs putniem.
3. Pilieniem ir jākrīt lēni, tāpēc ventilatoriem jābūt izslēgtiem uz 20-30 minūtēm.
4. Pirms vakcīnas izsmidzināšanas putnu novietnē ir jāsamazina apgaismojums un jānodrošina miers vakcinācijas laikā un pēc tās.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Dzīvnieku vakcīnas vīrusi ir jutīgi pret gaisu, saules gaismu, karstumu, dezinfekcijas līdzekļiem un mazgāšanas līdzekļiem, tāpēc vakcīna ir jāsargā no iepriekš minētajiem faktoriem.

Neizmantojot tabletes, kas atrodas bojātos blisteru nodaļījumos. Nekarsēt ūdeni, kas satur vakcīnu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešās iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas saskaņā ar norādījumiem: izlietot nekavējoties.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai klīniski veselus putnus, kas nav pakļauti stresam, piem., pārpildītas novietnes, pārkāršana, atdzišana, nepietiekoša barošana utt.

Nodrošināt precīzu devu (izvairīties no mazākas devas ievadīšanas).

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Vakcīna var izraisīt vieglu konjunktivītu, kas var ilgt 2-3 dienas. Rīkojoties ar vakcīnu, jāizvairās no tās iekļūšanas acīs. Ja vakcīna ir izsmidzināma, darbiniekam ir obligāti jālieto aizsargbrilles un aizsargmaska.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Lai izvairītos no jebkādas mijiedarbības, jāpārtrauc dzeramā ūdens apstrāde un dezinfekcija 24 stundas pirms vakcinācijas (ja vakcīnu lieto ar dzeramo ūdeni). Pieejamie drošuma un iedarbīguma pētījumi pierāda, ka šo vakcīnu var lietot tai pašā dienā, bet nedrīkst lietot maisījumā ar V.H.+H-120 liofilizāts ūdens šķīduma pagatavošanai vistām.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pierādīts vakcīnas drošums vienu dienu veciem SPF (brīviem no specifiskiem patogēniem) cāļiem, intraokulāri lietojot 0,05 ml (10 reizes lielāku devu par ieteikto).

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

11/2023

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Lietošanai dzīvniekiem.