

ЛИСТОВКА :

BIO THYRNOID / БИО ТИФОИД

Високо имуногенен щам на *Salmonella gallinarum*, минимум титър преди инактивация $>3,5 \times 10^8$ CFU. Маслена емулсия на инактивирана ваксина за инжекционно приложение при птици.

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба :

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.
Via Vezza d'Oglio 3,
Milan 20139
Italy

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A
Via Baviera 9
35027 NOVENTA PADOVANA
Italy

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

BIO THYRNOID

Високо имуногенен щам на *Salmonella gallinarum*, минимум титър преди инактивация $>3,5 \times 10^8$ CFU. Маслена емулсия на инактивирана ваксина за инжекционно приложение при птици.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

СЪСТАВ ЗА 1 ДОЗА (0,5 ml)

Активна субстанция:

Високо имуногенен щам на *Salmonella gallinarum*, минимум титър преди инактивация $>3,5 \times 10^8$ CFU

Адjuвант:

маслен пълнител до 0,5 ml

Експципиент:

Тиомерсал най много 0,050 mg

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Активна имунизация на подрастващи стокови носачки срещу инфекция, причинена от *Salmonella gallinarum*.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Локална реакция при правилно извършена ваксинация не се наблюдава, но следи от мазнина може да се появят на мястото на инжектирането, за известно време.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Подрастващи стокови носачки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ

Подрастващите стокови носачки се ваксинират на 6-8 седмична възраст. Реваксинацията се извършва на 12-14 седмична възраст. Всяка доза от 0,5 ml трябва да бъде инжектирана подкожно (дорзалната част на шията) или интрамускулно (гръдните мускули).

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

В момента на прилагане ваксината трябва да бъде със стайна температура (+20°C). Разклащайте ваксината преди и по време на употреба. При аплициране да се използват асептични методи. Да се избягва интравенозно инжектиране.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Няма.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Да се ваксинират само здрави птици.

Родителите трябва да бъдат изследвани преди ваксинацията за *S. Enteridis*, тъй като ваксина BIO THYRNOID може да даде положителна серологична реакция.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

За потребителите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подуване, особено при инжектиране в става или пръст и в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако не е оказана навреме лекарска помощ.

Ако по случайност сте инжектирани с този ветеринарномедицински продукт, потърсете спешно съвет от лекар и носете листовката с Вас, дори да е инжектирано съвсем малко количество.

Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет от лекаря.

За лекарите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани малки количества, случайното инжектиране с този ветеринарномедицински продукт може да предизвика поява на силен оток. При инжектиране в пръста е възможно развитие на исхемична некроза и дори загуба на пръста. Необходима е незабавна, компетентна хирургическа намеса. Възможно е да се наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено, ако са засегнати пулпата на пръста или сухожилието.

Яйценосене:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е установена по време на яйценосния период, поради тази причина не се препоръчва прилагането на ваксина Bio Thyroid преди или по време на яйценосния период.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да прецени според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Няма налични данни.

Основни несъвместимости:

Не са известни.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

12/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Република България

„САМ БС“ ЕООД

бул. „д-р Петър Дертлиев“ 25

1335, София

тел: + 359 (02) 8100173

Д-Р ИВАН ШИКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР