

ETIQUETA-PROSPECTO PARA:

ADO-CLORHEXIDINA CHAMPÚ

Código Nacional: 570470.8

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote:
LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
Les Franqueses del Vallès, (Barcelona)
España

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ADO-CLORHEXIDINA CHAMPÚ
Clorhexidina digluconato

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada ml contiene:
Clorhexidina digluconato20 mg
Excipientes, c.s.

4. INDICACIÓN(ES) DE USO

Tratamiento tópico de la pioderma canina causada por *Staphylococcus intermedius*, complementario de la oportuna terapia sistémica.

5. CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con hipersensibilidad a la sustancia activa.

6. REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente puede dar lugar a reacciones de hipersensibilidad.

7. ESPECIES DE DESTINO

Perros.

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía tópica exclusivamente.

La frecuencia de aplicación del champú será la de 2 baños por semana durante 4 semanas.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Aplicar el champú sobre el pelo húmedo del animal, frotando hasta conseguir espuma. Se realizará una primera aplicación y se enjuagará con agua abundante. Posteriormente se realizará una segunda aplicación y se dejará actuar sobre el pelo del animal durante 10 minutos, tras los cuales se enjuagará con abundante agua.

10. TIEMPO DE ESPERA

No procede.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservación en condiciones normales, al abrigo de la luz.

12. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Advertencias especiales para cada especie de destino:

Evitar el contacto con los ojos y con el oído interno, si se produjera, lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión accidental, aplicar un tratamiento sintomático. No obstante dada su baja toxicidad y su escasa absorción por vía digestiva no es de esperar efecto alguno.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Evitar el contacto con los ojos, si se produjera, lavar inmediatamente con abundante agua.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):

El modo de empleo de este producto hace poco probable una intoxicación por sobredosificación.

Incompatibilidades:

Con los detergentes aniónicos.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADA LA ETIQUETA-PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

30 de agosto de 2013

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Uso veterinario

Reg. nº: 1.482 ESP

Formato: 250 ml.

Lote:

CAD {mes/año}